



麻醉资料

全身麻醉 General Anaesthesia

简介

全身麻醉是利用麻醉气体透过面罩、呼吸道输气导管、其他输气装置或静脉注射使患者在手术中安全地失去意识和知觉。通常麻醉气体及静脉注射药会一同使用。在麻醉过程中，麻醉科医生会利用精密的仪器监测、控制及调节患者的身体机能。麻醉科医生会精确地计算麻醉的时间及深度，并不断地按患者的身体状况作出调整，以确保手术能顺利地进行。手术完成后，麻醉科医生会安排患者在复苏室，直至恢复意识及知觉。

治疗效果

全身麻醉后，患者会进入睡眠状态，因此不会感受到因手术而带来的疼痛，从而减低尴尬、不安及焦虑。

可能出现的风险及并发症

常见：

1. 可能会感到疲倦、渴睡、恶心、甚至呕吐。
2. 药物过敏(出现严重反应的机会率低于 0.01%)。
3. 因长时间卧床使身体部分受压而产生麻痹，导致皮肤红肿、溃烂、损害神经，甚至失明。
4. 可能因插入呼吸道输气导管而出现牙龈、牙齿损伤或喉咙疼痛，较松的牙齿或固定的假牙有可能会增加插入呼吸道输气导管时之风险。
5. 若空腹时间不足，会增加吸入性肺炎的风险，严重时可致命。
6. 在手术中恢复知觉(机会率低于 0.3%)。
7. 手术后可能会出现尿滞留的情况，此情况于年长男性中较为常见。

不常见：

1. 肺炎
2. 心脏病病发
3. 中风
4. 死亡(罕见)

** 可能出现之风险或并发症未能尽录。患者应明白无论过程如何妥善，仍有出现并发症的风险。如附近器官受损、手术后严重出血或渗漏时，可能需要进行另一手术治疗这些并发症及较长的麻醉时间。

麻醉前准备

1. 麻醉科医生会向患者解释麻醉程序及可能出现之并发症，患者明白后便须签署同意书。
2. 麻醉前 6 小时禁止饮食。

如您对麻醉有任何疑问或忧虑，请联络主诊医生。

经过医生的悉心诊治，相信您会逐渐康复。

若您阅读此章程后有任何查询，请记下相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知

