



手術資料

乳房腫塊切除術 Excision of Breast Lump

簡介

乳房腫塊切除術是常見的外科手術。此手術會切除乳房腫塊，通常只有一小塊組織會被切除，因此胸部的外型及大小不會有大變化。

治療成效

此手術可作治療及診斷之用。

手術過程

1. 在全身麻醉下進行。
2. 利用觸診或超音波定位方法，找出腫塊位置並進行切除。
3. 縫合傷口並用無菌敷料覆蓋。

可能出現的風險及併發症

1. 傷口發炎
2. 傷口積血(需再施行手術清除血塊)
3. 傷口出血

** 可能發生之風險或併發症未能盡錄。病人應明白無論手術如何妥善，仍有發生併發症的風險。如附近器官受損、術後嚴重出血或滲漏時，便有可能需要施行另一手術來處理這些併發症。

手術前的預備

1. 保持個人衛生可預防外科傷口感染。
2. 醫生會向病人解釋施行手術的原因、程序及可能發生之併發症，病人明白後便可簽署同意書。
3. 請告知醫生及護士所有以往病歷、曾進行過的手術、最近所服用的藥物及因藥物或麻醉而引致的併發症。
4. 術前6至8小時禁止飲食。
5. 請脫下身上所有衣物(例如內衣褲、假牙、飾物和隱形眼鏡等)，然後換上手術衣。
6. 手術前請先排清小便。

手術後須知

一般情況

1. 全身麻醉後，病人可能會：
 - 因麻醉時曾插喉而引致喉部輕微不適或疼痛；
 - 出現麻醉藥的副作用，包括疲倦、渴睡、噁心或嘔吐，如情況持續或加劇，請通知護士。
2. 如傷口感到疼痛，可通知護士，護士會按醫生指示為病人注射止痛針或提供口服止痛藥。

傷口處理

1. 手術後，傷口會蓋上無菌敷料及防水膠布，以免傷口感染。
2. 如傷口已貼上防水膠布，病人便可照常淋浴，請保持傷口清潔乾爽。
3. 手術後宜穿寬鬆衣物，以免傷口受壓。

飲食

在一般情況下，待麻醉藥力過後，可回復正常飲食，毋須戒口。

活動

1. 飲食後，如無不適，便可以下床活動，需要時可服食止痛藥。
2. 一般於手術後翌日便可出院。

出院後注意事項

1. 手術後配戴合適的胸圍可減輕痛楚。
2. 沒有限制，可自由活動。
3. 如傷口部位的痛楚加劇及出現紅腫、觸痛、有濃性滲液或滲血、寒顫、發熱(體溫高達 38°C 或 100.4°F 以上)或其他異常情況等，請即聯絡主診醫生或回院診治。
4. 請於指定日期、時間及地點覆診。

如病人對此手術有任何疑問或憂慮，請聯絡主診醫生。

經過醫生的悉心診治，相信病人會逐漸康復，並祝生活愉快！

若病人閱讀此單張後有任何查詢，請記下相關問題，以便醫生作出跟進。

由仁安醫院手術室管治委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢
本院保留一切刪改此單張之權利，而不作另行通知