



手术资料

乳房肿块切除术 Excision of Breast Lump

简介

乳房肿块切除术是常见的外科手术。此手术会切除乳房肿块，但通常只切除一小块组织，因此胸部的外型及大小不会有太大变化。

治疗效果

此手术可作治疗及诊断用途。

手术过程

1. 在全身麻醉下进行。
2. 利用触诊或超声波定位方法，找出肿块位置并切除。
3. 缝合并用无菌敷料覆盖。

可能出现的风险及并发症

1. 刀口发炎
2. 刀口积血(需再手术清除血块)
3. 刀口出血

** 可能出现的风险或并发症未能尽录。患者应明白无论手术如何妥善，仍有出现并发症的风险。如附近器官受损、术后严重出血或渗漏时，便有可能需要施行另一手术来处理这些并发症。

手术前的准备

1. 保持个人卫生可预防刀口感染。
2. 医生会向患者解释施行手术的原因、过程及可能出现的并发症，患者明白后便须签署同意书。
3. 请告知医生及护士所有以往病史、曾进行过的手术、最近所服用的药物及因药物或麻醉剂而引致的并发症。
4. 术前6至8小时禁止饮食。
5. 请除去身上所有衣物(如内衣裤、假牙、饰物和隐形眼镜等)，换上手术衣。
6. 手术前请先排清小便。

手术后须知

一般情况

1. 全身麻醉后，患者可能会：
 - 因麻醉时曾插管而引致喉部轻微不适或疼痛；
 - 出现麻醉药的副作用，包括疲倦、渴睡、恶心或呕吐，如情况持续或加剧，请通知护士。
2. 如刀口部位疼痛，可通知护士，护士会按医生指示为患者注射止痛针或提供口服止痛药。

刀口处理

1. 手术后，刀口会盖上无菌敷料及防水胶布，以防感染。
2. 如刀口已贴上防水胶布，患者便可照常淋浴，请保持清洁干燥。
3. 手术后宜穿宽松衣物，以免刀口受压。

饮食

一般情况下，待麻醉药作用过后，可恢复正常饮食，毋须忌口。

活动

1. 饮食后，如无不适，便可以下床活动，需要时可服止痛药。
2. 一般于手术后翌日便可出院。

出院后注意事项

1. 手术后配戴合适的文胸可减轻疼痛。
2. 没有限制，可自由活动。
3. 如刀伤口部位的疼痛加剧及出现红肿、触痛、有浓性渗液或渗血、寒颤、发烧(体温高达 38°C 或以上)或其他异常情况，请即联络主诊医生或回院治疗。
4. 请按时复诊。

如您对此手术有任何疑问或忧虑，请联络主诊医生。

经过医生的悉心诊治，相信您会逐渐康复。

若您阅读此章程后有任何查询，请记下相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知