



## 治療程序資料

# 金屬線定位切除術 Wire Localization Excision

### 簡介

金屬線定位切除術可在乳房 X-光造影或超聲波的導引下，確定未能觸摸的乳房病變位置，然後以外科手術切除。

### 治療成效

此手術可以把未能觸摸的乳房腫瘤或鈣化點切除及確立診斷之用。

### 治療過程

1. 定位過程會由放射科醫生在局部麻醉下進行。
2. 放射科醫生利用超聲波或乳房 X-光造影的輔助下，置入一條幼長的金屬線在乳房的病變部位。
3. 扣上金屬線末端的小鈎，以防止金屬線鬆脫。
4. 置入金屬線定位後，病人會送往手術室在全身麻醉下切除乳房病變部位。

### 可能出現的風險及併發症

1. 傷口出血
2. 傷口感染
3. 永久性疤痕
4. 金屬線脫落(不常見)

\*\* 可能出現之風險或併發症未能盡錄。病人應明白無論治療如何妥善，仍有出現併發症的風險。如附近器官受損、治療後嚴重出血或滲漏時，可能需要進行另一手術治療這些併發症。

### 治療前的預備

1. 保持個人衛生可預防外科傷口感染。有見於此，院方建議病人於治療當日清洗身體及頭髮。
2. 醫生會向病人解釋施行治療的原因、程序及可能出現之併發症，病人明白後便可簽署同意書。
3. 請告知醫生及護士所有以往病歷、曾進行過的手術、最近所服用的藥物及因藥物或麻醉而引致的併發症。
4. 醫生可能會處方手術前驅藥物或靜脈輸液。
5. 程序前 6 至 8 小時禁止飲食。
6. 請脫下身上所有衣物(例如內衣褲、假牙、飾物和隱形眼鏡等)，然後換上手術衣。
7. 程序前請先排清小便。

## 治療後須知

### 一般情況

1. 全身麻醉後，病人可能會：
  - 因麻醉時曾插喉而引致喉部輕微不適或疼痛；
  - 出現麻醉藥的副作用，包括疲倦、渴睡、噁心或嘔吐，如情況持續或加劇，請通知護士。
2. 如傷口感到疼痛，可通知護士，護士會按醫生指示為病人注射止痛針或提供口服止痛藥。
3. 置入金屬線後，為防止金屬線脫落，請避免進行任何活動。

### 傷口處理

1. 應保持傷口清潔及乾爽。
2. 治療後宜穿寬鬆衣物，以免傷口受壓。

## 出院後注意事項

1. 如傷口部位的痛楚加劇及出現紅腫、觸痛、有濃性滲液或滲血、寒顫、發熱(體溫高達 38°C 或 100.4°F 以上)或其他異常情況等，請即聯絡主診醫生或回院診治。
2. 請於指定日期、時間及地點覆診。

如病人對此程序有任何疑問或憂慮，請聯絡主診醫生。

經過醫生的悉心診治，相信病人會逐漸康復，並祝生活愉快！

若病人閱讀此單張後有任何查詢，請記下相關問題，以便醫生作出跟進。

---

---

---

由仁安醫院手術室管治委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢  
本院保留一切刪改此單張之權利，而不作另行通知