

手术资料

乳房肿块组织穿刺检查 (Breast Core Biopsy)

简介

乳房肿块组织穿刺检查是利用抽取组织专用的仪器，在局部麻醉下取出部分乳房肿块，作活组织检验。

检查过程

1. 此检查在局部麻醉下进行，患者完全清醒
2. 医生先在乳房肿块旁的皮肤上，注射局部麻醉药
3. 利用小尖刀作一小切口，经切口放入抽取组织仪器上的粗针，抽取组织作检验
4. 一般要抽取 3-4 个样本作检验

可能出现的风险及并发症

1. 穿刺部位出血，形成血肿或瘀青现象
2. 刀口感染
3. 若抽取组织不足，须再施行另一次穿刺做组织抽样
4. 局部麻醉药过敏反应
5. 经胸腔穿刺可引致气胸(但较罕见)

** 可能出现之风险或并发症未能尽录。患者应明白无论手术如何妥善，仍有出现并发症的风险。并可能需要进行另一手术来处理这些并发症。

检查前的准备

1. 此乃一项小型手术，医生会向患者解释手术原因、程序及可能出现之并发症，患者明白后可签署同意书。
2. 手术前不用限制饮食。
3. 宜穿著上下身分开的衣服。

检查后须知

1. 手术后刀口会敷上压力敷料以助止血。
2. 依照医护人员指示处理刀口。
3. 刀口将于手术后 2 至 3 天愈合；乳房穿刺部位出现轻微瘀青乃正常现象，瘀青约一星期后会自然消散。
4. 医生会处方止痛药，需要时服用。

出院后注意事项

复诊：请于指定日期及时间到医生指定的地点复诊。

备注：如有任何查询，请联络主诊医生。

参考资料

Harvard Health Publications – Breast Core Biopsy (网址:www.health.harvard.edu/diagnostic-tests/stereotactic-biopsy-of-the-breast.htm)

The Chinese University of Hong Kong – What is a Core Biopsy (网址: www.droid.cuhk.edu.hk/web/service/breast/what_is_corebiopsy.htm)

由仁安医院手术同意书工作委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询
本院保留一切更改或删改此章程之权利，而不作另行通知