

## 手术资料

### DHI 植发治疗 (DHI Transplantation)

#### 简介

植发治疗是一种手术，最佳效果将会由第十至十二个月开始出现，情况及成效会因人而异。植发后不能百分之百保证其成效，但手术乃依据客人之期望及医生之估计得到共识而进行。任何手术均具有风险，植发手术一般是十分安全的，但在罕有的情况下，会有不能预计的风险或副作用出现。

手术进行期间，客人须要接受局部麻醉药的注射和服用镇静药物。手术后亦须服用药物和头发护理。

#### 可能出现的风险及并发症

1. 药物过敏:

药物过敏反应是有可能出现的。客人请于手术前向医生报告其健康状况及申报其以往之药物过敏史。只有少于 0.1% 的人，对局部麻醉药物有过敏反应。

2. 发炎及出血现象:

虽然植发治疗属于一种低风险之外科手术，术后发炎及出血仍是有可能发生的，但手术后服用之药物可减低此风险。出现发炎情况非常罕见，通常少于 0.1%。出血量很少，注射血管收缩药物更可将出血量减至最低。

3. 捐赠部位不适及麻痹:

捐赠部位之皮下幼小神经于手术期间或会被切断，方可取出完整的头发毛囊，术后捐赠部位有可能感到不适或麻痹，维持数个月或更久。

4. 疤痕:

如客人没有创伤后容易产生疤痕或肉芽的倾向，留下疤痕是罕见之后遗症，机会少于 0.01%。

5. 脱发:

脱发现象是一种持续之生理现象。如已有此现象发生，术后幼小或正常之头发可能会比预期中较早脱落，此乃短暂现象。头发通常在数个月后重新生长。

6. 疼痛:

注射局部麻醉药时有极之轻微的痛楚，但手术时完全没有痛觉。手术后可能有轻微痛楚，使用简单止痛剂便可有效控制。

\*\* 可能发生之风险或并发症未能尽录。病人应明白无论手术如何妥善，仍有发生并发症的风险。

备注: 如有任何查询，请联络你的医生。

#### 参考资料

1. Roberts S Haber and Dowling B Stough(2006). Procedures in cosmetic dermatology: Hair Transplantation. USA:Elsevier Saunders.
2. Walter P Unger and Ronald Shapiro (2004). Hair Transplantation (4<sup>th</sup> ed.). USA: Marcel Dekker.
3. Wikipedia (2010). Lidocaine. Retrieved from <http://en.wikipedia.org/wiki/Lidocaine.com>.

由仁安医院手术同意书工作委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询  
本院保留一切更改或删改此章程之权利，而不作另行通知