仁安醫院
UNION HOSPITAL

請掃描以下二維碼以獲取電子檔案。

牙科治療程序資料

矯齒微植體
Orthodontic Mini-Screw

簡介

矯齒微植體是把細小的鈦金屬植體植入牙床骨或顎骨，以協助拉動牙齒到合適的位置。矯齒微植體又稱「微型植體」或「暫時性錨定裝置」。



圖片來源:
https://d2zp5xs5cp8zlg.cloudfront.net/image-7148-800.jpg

治療成效

此程序目的是要作矯正的錨定，以幫助移動排列不齊的牙齒。植入微植體後，可助於拉合拔牙後的空隙、更有效地將牙齒向上下移動至正確位置及拉動阻生及傾斜牙齒。

治療過程

1. 微植體一般會在矯齒時植入；
2. 局部麻醉牙齦；
3. 在下顎鑽一小孔用以植入植體或直接把植體小心地植入牙骨。

可能出現的風險及併發症

1. 此治療沒有嚴重的風險及併發症，成功率達 80%以上。
2. 植入植體時可能會觸碰牙齦，但無需擔心，受損的牙齦會自然痊癒。
3. 可能會變得鬆脫，但一般可在覆診時更換。
4. 可能需要提早更換或拔除。
5. 可能會在植入時斷裂。
6. 如沒有按照醫生的指示保持植入骨釘的位置清潔，便會增加感染的機會。

** 可能發生之風險或併發症未能盡錄。客人應明白無論治療如何妥善，仍有發生併發症的風險。可能需要進行另一治療處理這些併發症。

治療前的預備

醫生會向客人解釋施行治療的原因、程序及可能發生的併發症。

COPYRIGHT UNION HOSPITAL

植入骨釘後的注意事項

1. 待麻醉藥作用消退後，客人初期可能會感到植入植體的位置有輕微疼痛。
2. 治療後的 3 – 5 天，牙齒可能會有少許腫脹感。
3. 需每天使用含氟化物的牙膏及微細刷頭的牙刷輕刷植體周圍二次，請勿使用電動牙刷。
4. 治療後的首 5 天，需每天使用能抑制牙菌膜的漱口水(Cholorhexidine Mouthwash)清潔植體周圍二次。
5. 請勿用手指或舌頭撥弄植體。

如客人對此程序有任何疑問或憂慮，請聯絡牙科醫生。

經過牙科醫生的悉心診治，相信客人會逐漸康復，並祝生活愉快！

若客人閱讀此單張後有任何查詢，請記下相關問題，以便牙科醫生作出跟進。

_____

_____

_____

由仁安醫院手術室管治委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢
本院保留一切刪改此單張之權利，而不作另行通知

COPYRIGHT UNION HOSPITAL