

手術資料


食道胃十二指腸內視鏡檢查(俗稱胃鏡) Oesophago-Gastro-Duodenoscopy(OGD)

簡介

食道胃十二指腸內視鏡檢查(俗稱胃鏡)是利用一條柔軟而可彎曲的內視鏡由口進入食道、胃及十二指腸進行上消化道檢查。醫生在電視螢光幕觀察胃內的狀況或病變，如腫瘤、潰瘍或息肉等，有需要時，醫生會抽取病變組織進行化驗，或作止血或息肉切除。

為何需要接受此檢查?

1. 貧血或腸胃出血
2. 胃痛
3. 胃酸倒流
4. 吞嚥困難
5. 原因不明之腹痛
6. 息肉、腫瘤
7. 胃癌普查
8. 取出食道及胃內異物，例如魚骨等



檢查過程

1. 病者須作左側臥，帶上牙墊。
2. 醫護人員會按醫生處方施行喉嚨局部噴霧麻醉及鎮靜劑注射。
3. 醫生把胃鏡由口放進胃內，病者會感覺腹部有脹迫感，均屬正常。
4. 檢查過程約需十五分鐘。
5. 檢查可在沒有鎮靜劑注射下進行，詳情請向醫生查詢。

可能出現的風險及併發症

1. 呼吸道併發症：如吸入性肺炎
2. 腸胃道出血機會率小於 1:1,000，穿破率 3:10,000，死亡機會率 1:10,000；如要接受內視鏡治療程序(如息肉切除、內視鏡止血等)，出現併發症之機會較高。
3. 喉部不適
4. 暫時性腸胃氣脹

檢查前的預備

1. 醫生解釋檢查原因、程序及可能發生之併發症，病人明白後便簽署同意書。
2. 胃鏡檢查可於門診或入院進行，請向你的醫生查詢。
3. 請於檢查前六小時開始禁食及飲水。
4. 檢查前，你會被安排更換手術衣著；亦需除去身上之飾物、隱形眼鏡、金屬物品及假牙等(如有需要，請自備隱形眼鏡盛載器)。

檢查後須知

1. 檢查後，應臥床休息，待鎮靜劑藥力消失後方可起床活動，而鎮靜劑藥物可能需要三至四小時才完全消失。

門診病人

離院時需要有朋友或家人陪同，以策安全。如病人沒有家人或朋友陪同，檢查後則須安排病床以作休息(需收取額外觀察費用)。

2. 請於胃鏡檢查一小時後才進食(住院病人需向病房護士查詢何時可以開始進食)。
3. 由於醫生在進行檢查期間把空氣打入胃內，以增加觀察範圍，所以病人檢查後會有輕微胃脹或痛的感覺，而喉部也會有些微不適。
4. 若腹部有劇痛，請即通知醫護人員。

備註: 如有任何查詢，請聯絡你的醫生。

參考資料

醫院管理局 – 智友站(網址: http://www21.ha.org.hk/smartpatient/tc/operationstests_procedures.html)

由仁安醫院手術同意書工作委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢
本院保留一切更改或刪改此單張之權利，而不作另行通知