

手术资料


食道胃十二指肠内视镜检查(俗称胃镜) Oesophago-Gastro-Duodenoscopy(OGD)

简介

食道胃十二指肠内视镜检查(俗称胃镜)是利用一条柔软而可弯曲的内视镜由口腔进入食道、胃及十二指肠进行上消化道检查。医生通过电视荧光屏观察胃内的状况或病变，如肿瘤、溃疡或息肉等，有需要时，医生会抽取病变组织进行化验，或作止血或息肉切除。

为何需要接受此检查?

1. 贫血或肠胃出血
2. 胃痛
3. 胃酸倒流
4. 吞咽困难
5. 原因不明之腹痛
6. 息肉、肿瘤
7. 胃癌普查
8. 取出食道及胃内异物，例如鱼刺等



检查过程

1. 病者须作左侧卧，戴上牙垫。
2. 医护人员会按医生处方施行喉咙局部喷雾麻醉及注射镇静剂。
3. 医生把胃镜由口腔放进胃内，病者会感觉腹部有胀迫感，均属正常。
4. 检查过程约需十五分钟。
5. 检查可在没有镇静剂下进行，详情请向医生查询。

可能出现的风险及并发症

1. 呼吸道并发症：如吸入性肺炎
2. 胃肠道出血机会率小于 1:1,000，穿破率 3:10,000，死亡机会率 1:10,000；如要接受内视镜治疗程序(如息肉切除、内视镜止血等)，出现并发症之机会率较高。
3. 喉部不适
4. 暂时性胃肠胀气

检查前的准备

1. 医生解释检查原因、程序及可能发生之并发症，病人明白后便签署同意书。
2. 胃镜检查可于门诊或住院进行，请向你的医生查询。
3. 请于检查前六小时开始禁食及禁止饮水。
4. 检查前，你会被安排更换手术衣；亦需摘除身上之饰物、隐形眼镜、金属物品及假牙等(如有需要，请自备隐形眼镜盛载器)。

检查后须知

1. 检查后，应卧床休息，待镇静剂药效消失后方可起床活动，而镇静剂药效可能需要三至四小时才完全消失。

门诊病人

离院时需有朋友或家人陪同，以策安全。如病人没有家人或朋友陪同，检查后则须安排病床以作休息(需收取额外观察费用)。

2. 请于胃镜检查一小时后才进食(住院病人需向病房护士查询何时可以开始进食)。
3. 由于医生在进行检查期间把空气打入胃内，以增加观察范围，所以病人检查后会有轻微胃胀或疼的感觉，而喉部也会有轻微不适。
4. 若腹部有剧痛，请即通知医护人员。

备注: 如有任何查询，请联络你的医生。

参考资料

医院管理局 – 智友站(网址: http://www21.ha.org.hk/smartpatient/tc/operationstests_procedures.html)

由仁安医院手术同意书工作委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询
本院保留一切更改或删改此章程之权利，而不作另行通知