

手术资料


结肠内视镜检查(俗称肠镜) Colonoscopy

简介

结肠内视镜检查(俗称肠镜)是利用一条柔软而可弯曲的内视镜由肛门进入直肠，经乙状结肠、降结肠、横结肠、升结肠直至盲肠部位进行大肠检查。医生通过电视荧光屏观察肠内的状况或病变，如肿瘤、溃疡或息肉等，有需要时，医生会抽取病变组织进行化验，或作止血或息肉切除。

为何需要接受此检查?

1. 大便有血
2. 贫血
3. 大便习惯改变 (时而便秘，时而腹泻)
4. 慢性腹泻
5. 原因不明之腹痛
6. 息肉、肿瘤
7. 大肠癌普查



检查过程

1. 病者须作左侧卧，双膝向上屈曲。
2. 医生会按病人需要，处方镇静剂或麻醉药物。
3. 医生把肠镜由肛门放进大肠内，病者会感觉腹部有胀迫感或欲排便的感觉，均属正常。
4. 检查过程约需三十分钟。

可能出现的风险及并发症

检查前：

- 须服用泻药。这些药物可能会引致恶心、呕吐、腹痛或腹胀等不适。

检查期间：

- 注射的镇静药物可能会引致血压低、呼吸困难等症状，严重者可能会出现休克或昏迷；年长病人，出现这些症状的可能性较高。
- 肠镜检查，肠穿孔的机率为千分之二；但如以肠镜作治疗时，肠穿孔的风险较高。
- 肠穿孔会导致腹膜炎。患者须于全身麻醉下进行剖腹手术，修补或切除穿孔的肠道；据统计，术后死亡率约为百分之五。

检查后：

- 会有腹痛、腹胀等情况。多属暂时性，约于一小时内缓解。
- 切除息肉后可能会有肠出血的现象。肠出血机率为千分之一。此症状通常于检查后二十四小时内发生。

检查前的准备

1. 医生解释检查原因、程序及可能发生之并发症，病人明白后便签署同意书。
2. 肠镜检查可于门诊或住院进行，请向你的医生查询。
3. 检查前须保持肠道完全清洁，避免粪便阻碍观察大肠情况；灌肠可于门诊或住院进行，请按医生处方服用泻药。
4. 饮食安排
 - i) 检查前两天
只可进食低渣滓食物(避免高纤维食物，例如蔬菜、水果、麦片等)。
 - ii) 检查前一天
只可进食流质食物，例如肉汤、稀粥；但勿饮用过量奶类饮品。
5. 检查前六小时开始禁食。
6. 检查前，你会被安排更换手术衣；亦需摘除身上之饰物、隐形眼镜、金属物品及假牙等(如有需要，请自备隐形眼镜盛载器)。

检查后须知

1. 检查后，应卧床休息，待镇静剂药效消失后方可起床活动，而镇静剂药效可能需要三至四小时才完全消失。
门诊病人
离院时需有朋友或家人陪同，以策安全。如病人没有家人或朋友陪同，检查后则须安排病床以作休息(需收取额外观察费用)。
2. 由于医生在进行检查期间把空气打入肠道内，以增加观察范围，所以病人检查后会有气体排出。
3. 若腹部有剧痛或大便排血，请即通知医护人员。

备注: 如有任何查询，请联络你的医生。

参考资料

医院管理局 – 智友站(网址: http://www21.ha.org.hk/smartpatient/tc/operationstests_procedures.html)

由仁安医院手术同意书工作委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询
本院保留一切更改或删改此章程之权利，而不作另行通知