

手术资料


乙状结肠内视镜检查 (Sigmoidoscopy)

简介

乙状结肠内视镜检查是利用一条细长而可弯曲的内视镜，由肛门慢慢进入乙状结肠，在电视荧光屏监察下，医生可观察及诊断乙状结肠内的病变，如肿瘤或溃疡。有需要时，医生会抽取活组织进行化验及切除肠内的息肉。

为何需要接受此检查？

1. 大便有血
2. 慢性腹泻
3. 便秘
4. 排便异常
5. 肠内有息肉
6. 肿瘤



检查过程

1. 病者须作左侧卧，双膝向上屈曲。
2. 医生会按病人需要，处方镇静剂或麻醉药物。
3. 医生把乙状结肠内视镜由肛门放进乙状结肠内，病者会感觉腹部有胀迫感或欲排便的感觉，均属正常。
4. 检查过程约需十五分钟。

可能出现的风险及并发症

检查前：

- 须服用泻药以保持肠道清洁；这些药物可能会引致恶心、呕吐、腹痛或腹胀等不适。

检查期间：

- 注射的镇静药物可能会引致血压低、呼吸困难等症状，严重者可能会出现休克或昏迷；年长病人，出现这些症状的可能性较高。
- 乙状结肠内视镜检查，肠穿孔的机会率为千分之二；但如以乙状结肠内视镜作治疗时，肠穿孔的情况会高出几倍
- 肠穿孔会导致腹膜炎。患者须于全身麻醉下进行剖腹手术，修补或切除穿孔的肠；据统计，术后死亡率约为百分之五。

检查后：

- 会有腹痛、腹胀等情况。多属暂时性，将于一小时内缓解。

检查前的准备

1. 医生解释检查原因、程序及可能发生之并发症，病人明白后便签署同意书。
2. 乙状结肠内视镜检查可于门诊或住院进行，请向你的医生查询。
3. 检查前须保持肠道完全清洁，避免粪便阻碍观察乙状结肠的情况；灌肠可于门诊或住院进行，请按医生处方服用泻药。
4. 检查前六小时开始禁食。
5. 检查前，你会被安排更换手术衣;亦需摘除身上之饰物、隐形眼镜、金属物品及假牙等(如有需要，请自备隐形眼镜盛载器)。

检查后须知

1. 检查后，应卧床休息，待镇静剂药效消失后方可起床活动，而镇静剂药效可能需要三至四小时才完全消失。

门诊病人

离院时需有朋友或家人陪同，以策安全。如病人没有家人或朋友陪同，检查后则须安排病床以作休息(需收取额外观察费用)。

2. 由于医生在进行检查期间把空气打入肠道内，以增加观察范围，所以病人检查后会有气体排出。
3. 若腹部有剧痛或大便排血，请即通知医护人员。

备注: 如有任何查询，请联络你的医生。

参考资料

医院管理局 – 智友站(网址: http://www21.ha.org.hk/smartpatient/tc/operationstests_procedures.html)

由仁安医院手术同意书工作委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询
本院保留一切更改或删改此章程之权利，而不作另行通知