仁安醫院
UNION HOSPITAL

请扫描以下二维码以获取电子档案。

手术资料

耳前窦切除术
Preauricular Sinus Excision

简介

耳前窦是常见的先天性畸形。窦与皮肤连接的管，若被阻塞则会造成感染形成脓肿。耳前窦切除术是以外科手术切除耳前窦及清除以往因感染而留下的疤痕。

图片来源:
http://rlbatesmd.blogspot.com/2010/01/histologic-relationship-of-preauricular.html

适应症

1. 耳前窦曾有感染
2. 有症状的耳前窦，例如有溢液流出

治疗效果

此手术的预期效果是切除耳前窦，防止感染及缓解症状。

手术过程

1. 此手术会在全身或局部麻醉下进行；
2. 在耳前皮肤切一切口，包围窦口及疤痕组织；
3. 清除该处的软组织 (包括所有管)；
4. 缝合，并用无菌防水敷料覆盖；
5. 可能须要用绷带包扎头部。

可能出现的风险及并发症

1. 常见的风险及并发症 (≥1%)
   i) 刀口出血
   ii) 刀口感染/脓肿
   iii) 刀口破裂
   iv) 刀口愈合欠佳
   v) 疤痕/瘢痕瘤
   vi) 复发

2. 不常见的严重风险及并发症 (<1%)
   附近结构受损 (面部神经或血管)

** 可能出现之风险或并发症未能尽录。患者应明白无论手术如何妥善，仍有发生并发症的风险。如附近器官受损、术后严重出血或渗漏时，可能需要进行另一手术来处理这些并发症。

COPYRIGHT UNION HOSPITAL

手术前的准备

1. 医生会向患者解释手术的原因、过程及可能出现之并发症，患者明白后便须签署同意书。
2. 请告知医生及护士所有以往病史、曾进行过的手术、最近所服用的药物(包括中药及保健食品)及因药物或麻醉剂而引致的并发症。
3. 可能须要剃除耳朵前的毛发。
4. 若用全身麻醉进行手术，术前 6 小时禁止饮食。
5. 请除去身上所有衣物(如内衣裤、假牙、饰物和隐形眼镜等)，换上手术衣。
6. 手术前请先排清小便。

手术后须知

一般情况

1. 全身麻醉后，患者可能会:
   - 因麻醉时曾插管而引致喉部轻微不适或疼痛；
   - 出现麻醉药的副作用，包括疲倦、渴睡、恶心或呕吐，如情况持续或加剧，请通知护士。
2. 如刀口部位疼痛，可通知护士，护士会按医生指示注射止痛针或提供口服止痛药。
3. 麻醉药作用消退后，便可按医生指示恢复正常饮食。
4. 通常可在手术后当天出院。

刀口护理

1. 如头部有绷带，可在手术后一至两天摘掉。
2. 保持刀口清洁干燥。
3. 缝线会在一星期内拆除或自行溶解。

出院后注意事项

1. 请按照医生指示服药。
2. 如无不适，可照常上班或上学。
3. 请勿做剧烈、竞技运动及游泳。
4. 如刀口严重出血或有渗液、刀口红肿、疼痛增加、发冷、寒颤、发烧(体温高达 38ºC 或以上)或其他异常情况，请即联络主治医生或回院治疗。
5. 请按时复诊。

其他治疗方法

保守疗法：使用抗生素及用引流清除脓液

不治疗的后果

1. 感染风险及后遗症
2. 耳前窦引起的持续症状

COPYRIGHT UNION HOSPITAL

如您对此手术有任何疑问或忧虑，请联络主治医生。

经过医生的悉心治疗，相信您会逐渐康复。

若您阅读此章程后有任何查询，请记下相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

_____

_____

_____

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知

COPYRIGHT UNION HOSPITAL