



## 手术资料

### 颈部肿块切除术 Excision of Neck Mass

#### 简介


颈部肿块切除术是通过手术切除颈部肿块，以作诊断及治疗，切除的肿块需送到病理部作临床组织检验。

#### 治疗效果

1. 完全切除肿块，消除病患，改善外观
2. 取出组织作临床诊断

#### 手术过程

1. 手术根据肿块的大小及位置，决定在全身麻醉、局部麻醉、监测麻醉或静脉注射镇静剂下进行；
2. 在颈上切一切口；
3. 切除肿块；
4. 缝合。



图片来源:

<https://www.thomashosurgery.com/wp-content/uploads/2020/09/neck-lump-illustration-e1601209585797.png>

#### 可能出现的风险及并发症

1. 刀口出血
2. 刀口感染
3. 肩痛及抬肩乏力
4. 颈部皮肤麻痹
5. 疤痕增生或形成癭瘤
6. 皮肤坏死
7. 神经受损
8. 气胸
9. 乳糜漏
10. 淋巴肿

\*\* 可能出现之风险或并发症未能尽录。患者应明白无论手术如何妥善，仍有出现并发症的风险。如附近器官受损、手术后严重出血或渗漏时，可能需要进行另一手术治疗这些并发症。

## 手术前的准备

1. 保持个人卫生可预防刀口感染。患者于手术当天务必洗澡及洗头。
2. 医生会向患者解释施行手术的原因、过程及可能出现之并发症，患者明白后便须签署同意书。
3. 请告知医生及护士所有以往病史、曾进行过的手术、最近所服用的药物及因药物或麻醉剂而引致的并发症。如正服用影响血液凝固的药物，例如阿斯匹林(Aspirin)、华法林(Warfarin)、拜瑞妥(Xarelto)或百达生(Pradaxa)及中药和营养补充品，请尽早通知医生。
4. 术前6小时禁止饮食(只适用于全身麻醉)。
5. 请除去身上所有衣物(如内衣裤、假牙、饰物和隐形眼镜等)，换上手术衣。
6. 手术前请先排清小便。

## 手术后须知

### 一般情况

1. 有需要时，可能会放入引流管。
2. 垫高头部以减少瘀伤及肿胀。
3. 如有需要，可服用医生处方之止痛药。
4. 可在手术当天或翌日出院。

### 刀口护理

1. 请保持刀口清洁干燥。
2. 刀口部位会出现疤痕，但数月后会逐渐消退。

### 饮食

麻醉药作用消退后，便可按指示恢复正常饮食。

### 活动

一至两星期后便可恢复轻量活动。

## 出院后注意事项

1. 如刀口部位疼痛加剧或出现红肿、大量出血、虚脱、寒颤或发烧(体温高达38°C或以上)或其他异常情况，请即联络主诊医生或回院治疗。
2. 请按时复诊。

如您对此手术有任何疑问或忧虑，请联络主诊医生。

经过医生的悉心治疗，相信您会逐渐康复。

若您阅读此章程后有任何查询，请记下相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

---

---

---

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询  
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知

