


手术资料

功能性内视镜鼻窦手术 Functional Endoscopic Sinus Surgery

简介

功能性内视镜鼻窦手术是通过内视镜去除鼻及鼻窦疾病，建立鼻窦引流。此手术能改善鼻塞、后鼻漏、面部疼痛、头痛、预防鼻窦炎并发症及摘除肿瘤。



图片来源：
<http://www.perthcosmeticsurgery.com.au/sinus-surgery-procedure.do>

适应症

1. 鼻窦炎
2. 鼻息肉
3. 鼻或鼻窦肿瘤

手术过程

1. 在全身麻醉下进行
2. 在内视镜控制及监察下进行手术
3. 疾病组织会被切除，正常结构则予保留

可能出现的风险及并发症

1. 常见的风险及并发症 (≥1%)
 - i) 鼻膜出血
 - ii) 感染
 - iii) 鼻腔粘连
 - iv) 复发
 - v) 手术后有机会不能完全减轻症状和有复发可能
2. 不常见的严重风险及并发症 (<1%)
 - i) 损伤颈内动脉、筛前后动脉和蝶腭动脉，引致大出血
 - ii) 眼损伤，包括眶周淤血、眼球血肿或脓肿、重影及失明
 - iii) 泪管损伤，引致流泪
 - iv) 脑损伤，包括脑髓液鼻漏、脑膜炎、脑脓肿、脑气肿
 - v) 粘液囊肿
 - vi) 声音改变
 - vii) 暂时或永久失去嗅觉
 - viii) 由于手术的严重并发症而引致死亡

** 可能发生之风险或并发症未能尽录。病人应明白无论手术如何妥善，仍有发生并发症的风险。如附近器官受损、术后严重出血或渗漏时，可能需要进行另一手术来处理这些并发症。

手术前的预备

1. 医生会解释手术原因、程序及可能发生的并发症，病人明白后便可签署同意书。
2. 于手术前 6 至 8 小时 开始禁食及饮水(适用于全身麻醉)。
3. 除去身上所有衣物(包括内衣裤)和对象，例如假牙、饰物和隐形眼镜等，换上手术衣着。
4. 往手术室前先排清小便。

手术后须知

1. 手术后，两边鼻孔都会放有鼻敷料，您可能需要用口呼吸。敷料会于一至两日后取走。
2. 取走敷料后可能会轻微出血，但通常会自行止血。
3. 鼻水带有小量血丝乃属正常现象，同时您亦有可能感到鼻塞。

出院后注意事项

1. 若流血持续不止，请即联络主诊医生或回院诊治。
2. 覆诊：请于指定日期、时间到医生指定的地点覆诊。

其它治疗方法

1. 激素
2. 抗生素治疗感染

不治疗的后果

1. 症状持续或加重
2. 鼻窦炎并发症

备注：如有任何查询，请联络你的医生。

参考资料

医院管理局 – 智友站(网址: http://www21.ha.org.hk/smartpatient/tc/operationstests_procedures.html)

由仁安医院手术同意书工作委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询
本院保留一切更改或删改此单张之权利，而不作另行通知