



手術資料

眼瞼及眼周邊腫瘤切除手術 Excision of Eyelid & Ocular Tumor

簡介

眼瞼及眼周邊腫瘤是一種較常見之眼疾，一般可分為良性及惡性兩種。眼瞼腫瘤有數個類型，最常見的是痣和乳頭瘤。惡性眼瞼腫瘤包括基底細胞癌，皮脂腺癌，鱗狀細胞癌和黑色素瘤。

視乎病人情況，醫生可能會建議進行手術切除腫瘤。請與主診醫生商討決定最佳的治療方案。

治療成效

此手術可切除患眼的眼瞼腫瘤，有效預防或減低腫瘤再次復發、受感染和惡化的機會。

手術過程

1. 此手術可在局部或全身麻醉下進行；
2. 範圍較大的腫瘤，需要將眼瞼帶放鬆或借助同一側之另一眼皮，重新整合眼周邊組織；
3. 有機會需要借助眼周邊之組織、另一側眼皮組織或由身體其他部位取皮作植皮手術；
4. 患眼傷口會用眼墊覆蓋。

可能出現的風險及併發症

1. 傷口感染化膿
2. 傷口裂開或未能愈合
3. 形成癍痕、痂及疤
4. 未能完全切除腫瘤
5. 腫瘤重生、增大或擴散
6. 因腫瘤過大而未能重整眼瞼、眼周邊或面部
7. 眼瞼下垂、退縮或眼瞼及眼周邊變形
8. 因縫線或眼皮痂而引致眼部不適、角膜磨損等
9. 因結痂而引致眼球及眼皮互相黏連而導致複視
10. 腫瘤或手術所引起的疼痛或壓力可能會對身體有不良影響
11. 可能需要再次進行手術

** 可能發生之風險或併發症未能盡錄。病人應明白無論手術如何妥善，仍有發生併發症的風險。
如附近器官受損、手術後嚴重出血或滲漏時，可能需要進行另一手術治療這些併發症。

手術前的預備

1. 保持個人衛生可預防外科傷口感染。有見於此，院方建議病人於手術當日清洗身體及頭髮。
2. 醫生會向病人解釋施行程度的原因、程度及可能出現之併發症，病人明白後便可簽署同意書。
3. 請告知醫生及護士所有以往病歷、曾進行過的手術、最近所服用的藥物及因藥物或麻醉而引致的併發症。如正服用影響血液凝固的藥物，例如阿士匹靈(Aspirin)、華法林(Warfarin)、拜瑞妥(Xarelto)或百達生(Pradaxa)或非類固醇抗炎藥，例如布洛芬(Ibuprofen)、萘普生(Naproxen)及中藥，請儘早通知醫生。
4. 術前 6 小時禁止飲食。(只適用於全身麻醉)
5. 請脫下身上所有衣物(例如內衣褲、假牙、飾物和隱形眼鏡等)，然後換上手術衣。請勿於面部或眼部塗搽面霜、眼霜、乳液或化妝品。
6. 手術前請先排清小便。

手術後須知

一般情況

1. 全身麻醉後，病人可能會：
 - 因麻醉時曾插喉而引致喉部輕微不適或疼痛；
 - 出現麻醉藥的副作用，包括疲倦、渴睡、噁心或嘔吐，如情況持續或加劇，請通知護士。

傷口護理

1. 手術部位會蓋上眼墊以保護患眼，請保持傷口清潔及乾爽。
2. 睡覺時應使用眼罩，防止患眼受到磨擦或碰撞。
3. 為免更衣時衣服觸及眼睛引致發炎，建議穿著扣鈕式衣服，避免穿過頭衣服。
4. 請勿揉擦患眼。

飲食

1. 待麻醉藥效消退後，便可按指示恢復正常飲食。

活動

1. 首星期內，請避免洗頭。
2. 兩星期內，可如常淋浴，但請避免患眼沾水。
3. 請避免進行劇烈運動和提取重物。

出院後注意事項

1. 如屬惡性腫瘤，病人可能需要接受電療或化療、定期覆診或被轉介往其他專科如內科、外科或腫瘤科等。
2. 保持良好的個人衛生可減低感染的風險，尤其是眼部和手部衛生。
3. 短期內，請避免進行眼部化妝及佩戴隱形眼鏡，詳情請向醫生查詢。
4. 建議夜間去洗手間時開燈以防跌倒。
5. 請避免患眼沾上水、視液或洗頭水。
6. 請避免進行劇烈運動和提取重物，直至獲醫生同意恢復正常活動為止。
7. 如感到視力突然模糊、手術部位大量出血、發紅、腫脹、疼痛加劇、手術部位流出大量分泌物、寒顫、發熱(體溫高達 38°C 或 100.4°F 以上)或其他異常情況，請即聯絡主診醫生或回院診治。
8. 請於指定日期、時間及地點覆診。

如病人對此手術有任何疑問或憂慮，請聯絡主診醫生。

經過醫生的悉心診治，相信病人會逐漸康復，並祝生活愉快！

若病人閱讀此單張後有任何查詢，請記下相關問題，以便醫生作出跟進。

由仁安醫院手術室管治委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢
本院保留一切刪改此單張之權利，而不作另行通知

