

## 手術資料

### 認識倒睫 (Trichiasis)

#### 簡介

倒睫是指睫毛的生長方向是朝向眼球。


睫毛通常是向外生長的，但如果向著眼球生長就會產生不適和其它問題。睫毛的磨擦會導致異物感、眼紅、流淚、畏光、頻密地眨眼等。如果長久地有倒睫，眼球會受創而導致視力下降、感染甚至失明。

倒睫原因眾多。在本港，先天性倒睫，長期的瞼板發炎(如沙眼)等都很常見。

倒睫比較難根治，復發率也較高。如症狀不嚴重，可試用潤滑劑或抗生素眼膏以防止發炎。

數目很少的倒睫可用眉鉗拔除。但睫毛會在數週至數月後再行生出。如要永久去除倒睫，則要用電流或激光，將毛囊摧毀。兩種手術都很易進行，傷口亦不明顯。絕大部份皆可以在局部麻醉下進行。

如果倒睫牽涉大部分的睫毛，或者眼皮本身有內翻的毛病，則可考慮進行眼皮內翻矯正的手術。



圖片來源：  
<http://drcaster.com/74-Trichiasis/>

#### 可能出現的風險及併發症

1. 倒睫復發、重生或情況惡化
2. 結痂或感染
3. 情況未能改善或矯正過多
4. 角膜受損
5. 激光或電流引起之併發症如灼傷、失明等

\*\* 可能發生之風險或併發症未能盡錄。病人應明白無論手術如何妥善，仍有發生併發症的風險。如附近器官受損、手術後嚴重出血或滲漏時，可能需要進行另一手術治療這些併發症。

備註：如有任何查詢，請聯絡你的醫生。

由仁安醫院手術同意書工作委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢  
本院保留一切更改或刪改此單張之權利，而不作另行通知