



手术资料


倒睫治疗

Surgical Correction of Trichiasis (Ingrowing Eyelashes)

简介

倒睫是指睫毛向内生长而刺激眼球，可能导致眼部出现红肿、疼痛及泪水汪汪，视力也会因此变得模糊。若倒睫处理不当，可能会导致角膜感染、结痂，甚至失明。倒睫的成因有很多，眼部曾被灼伤或由手术引致受损也会引至倒睫。

人造泪液、拔除倒睫及激光治疗可缓解轻微的不适，若要彻底根治便需透过手术永久切除倒睫。请与主诊医生商讨决定最佳的治疗方案。



治疗效果

此手术可切除倒睫，也有助于预防与倒睫有关的眼部感染。若睫毛在同一位置重新生长，可能需要接受跟进治疗。

手术过程

1. 手术会在局部麻醉下进行；
2. 利用含碘消毒液清洗眼睑；
3. 医生可利用显微镜或放大镜寻找倒睫；
4. 将倒插睫毛的毛囊根部用电烧的方式破坏；
5. 在眼部涂上抗生素软膏；
6. 患眼刀口会用眼垫覆盖。

可能出现的风险及并发症

1. 倒睫复发、重生或情况恶化
2. 刀口结痂或感染
3. 情况未能改善或过度修正
4. 角膜受损
5. 激光或电流引起之并发症，如灼伤、失明等

** 可能出现之风险或并发症未能尽录。患者应明白无论手术过程如何妥善，仍有出现并发症的风险。如附近器官受损、程序后严重出血或渗漏时，可能需要进行另一手术治疗这些并发症。

手术前的准备

1. 保持个人卫生可预防感染。
2. 医生会向患者解释手术的原因、过程及可能出现之并发症，患者明白后便须签署同意书。
3. 请告知医生及护士所有以往病史、曾进行过的手术、最近所服用的药物及因药物或麻醉剂而引致的并发症。如正服用影响血液凝固的药物，例如阿斯匹林(Aspirin)、华法林(Warfarin)、拜瑞妥(Xarelto)或百达生(Pradaxa)或非类固醇抗炎药，例如布洛芬(Ibuprofen)、萘普生(Naproxen)及中药，请尽早通知医生。
4. 请除去身上所有衣物(如内衣裤、假牙、饰物和隐形眼镜等)，换上手术衣。请勿在面部或眼部涂面霜、眼霜、乳液或化妆品。
5. 术前请先排清小便。

手术后须知及出院后注意事项

1. 眼部彻底消肿需时数天。
2. 请按照医生指示使用抗生素。
3. 保持良好的个人卫生可减低感染的风险，尤其是眼部和手部卫生。
4. 如眼睛剧痛或视力模糊或其他异常情况，请即联络主诊医生或回院治疗。
5. 请按时复诊。

如您对此手术有任何疑问或忧虑，请联络主诊医生。

经过医生的悉心诊治，相信您会逐渐康复。

若您阅读此章程后有任何查询，请记下相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知