

手术资料

眼睑及眼周边肿瘤切除手术 (Excision of Eyelid & Ocular Tumor)

简介

眼睑及眼周边肿瘤是一种较常见之眼疾。一般可分为良性及恶性两种。

手术之需要

一般常见之需要如下：

1. 减少传染/感染：一般如睑疮等肿瘤可传染至眼部附近范围或身体其它各部位。切除后可减低其传染性。肿瘤亦可受感染及化脓。
2. 减低眼皮之负荷：如肿瘤开始增大，其一定之重量会引致上眼睑下垂或下眼睑外翻。
3. 如肿瘤属恶性则会蔓延至眼皮、眼周边、眼眶，眼窝或其它身体器官及皮肤等，如不治疗可致命。
4. 改善个人之外观。



手术过程

1. 可局部或全身麻醉进行，依据个人情况而定。
2. 一般來說如范围较大则需要将眼睑带放松或借助同一侧之另一眼皮，重新组合及重整眼周边，甚至可能需要借助眼周边之组织、另一侧眼皮之组织或由身体其它部位取皮作植皮手术。

可能出现的风险及并发症

1. 刀口感染化脓
 2. 刀口迸裂或未能愈合
 3. 瘢痕、痂及疤之形成
 4. 由于肿瘤之独特性质未能完全切除肿瘤
 5. 肿瘤重生、增大或扩散
 6. 由于肿瘤过大未能重整眼睑、眼周边或面部
 7. 眼睑下垂、退缩或眼睑及眼周边变形
 8. 因缝线或眼皮痂引致眼部不适、角膜磨损等
 9. 因结痂关系引致眼球及眼皮互相粘連而致复视
 10. 肿瘤或其手术所引致的疼痛/压力或会对身体健康有不良影响。
- ** 可能出现之风险或并发症未能尽录。患者应明白无论手术如何妥善，仍有出现并发症的风险。如附近器官受损、手术后严重出血或渗漏时，可能需要进行另一手术治疗这些并发症。

手术前的准备

1. 医生会解释手术原因、程序及可能出现的并发症，患者明白后便可签署同意书。
2. 于手术前6至8小时开始禁食及禁止饮水(只适用于全身麻醉)。
3. 脱去身上所有衣物(包括内衣裤)，摘除假牙、饰物和隐形眼镜等，换上手术衣。
4. 往手术室前先排清小便。

手术后须知

1. 如属恶性肿瘤需定期复诊，有需要会转介往其它专科如内科，外科，肿瘤科等。
2. 手术可能需要重做一次或数次。
3. 如肿瘤属恶性有可能手术后需要放疗或化疗。

出院后注意事项

1. 如手术部位剧痛、出血、有大量泪水分泌，请即联络主诊医生或回院诊治。
2. 复诊：请于指定日期、时间到医生指定的地点复诊。

备注：如有任何查询，请联络你的医生。

由仁安医院手术同意书工作委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询
本院保留一切更改或删改此章程之权利，而不作另行通知