



检查资料

肝脏活组织检查 Liver Biopsy

简介

肝脏活组织检查是一项切除一小块肝组织，诊断及检查怀疑肝脏组织的病变。肝组织标本可以通过经皮及穿刺活检、经颈静脉芯针、腹腔镜检查、开放性手术和超声波引导下注射而取得组织。如患有急性或慢性肝炎、肝功能异常、肝衰竭或肝硬化等症状，需做此检查。

治疗效果

肝脏活组织检查可为患者提供有用数据，可诊断病因、评估病情及制定日后治疗方案。

检查过程

1. 此检查会在局部或全身麻醉下进行；
2. 在皮肤上开一小孔；
3. 患者需憋气，把穿刺针透过小孔放进肝脏，然后抽取肝组织。
4. 肝活组织会被送往病理部检验。

可能出现的风险及并发症

1. 疼痛
2. 感染
3. 出血
4. 附近器官受损

** 可能出现之风险或并发症未能尽录。患者应明白无论检查如何妥善，仍有出现并发症的风险。

检查前的准备

1. 保持个人卫生可预防刀口感染。
2. 医生会向患者解释检查的原因、过程及可能出现之并发症，患者明白后便须签署同意书。
3. 请告知医生及护士所有以往病史、曾进行过的手术、最近所服用的药物及因药物或麻醉剂而引致的并发症。如正服用影响血液凝固的药物，例如阿斯匹林(Aspirin)、华法林(Warfarin)、拜瑞妥(Xarelto)或百达生(Pradaxa)及中药，请尽早通知医生。
4. 根据医生指示，检查前数天可能需要停药薄血药。
5. 检查前6小时禁止饮食。
6. 患者可能需要进行血液测试。
7. 患者需保持仰卧姿势。

检查后须知

1. 护理人员会密切监察患者的脉搏及血压。
2. 检查后的数分钟至数小时内可能会出现轻微上腹痛。
3. 待患者情况稳定后便可恢复正常饮食。

出院后注意事项

1. 为防止刀口部位出血，请勿在检查后的两週内做剧烈活动或运动。
2. 如刀口部位的疼痛加剧及出现红肿、眩晕、休克、剧烈腹痛、寒颤、发烧(体温达 38°C 或以上)或其他异常情况，请立即联络主诊医生或回院治疗。
3. 请按時复診。

如您对此检查有任何疑问或忧虑，请联络主诊医生。

经过医生的悉心诊治，相信您会逐渐康复，并祝生活愉快！

若您阅读此章程后有任何查询，请记住相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知