



檢查資料

麻醉下檢查 Examination under Anaesthesia

簡介

當病人不能在沒有麻醉的情況下進行檢查(例如因健康狀況或受心理影響)時，醫生便會建議進行麻醉下檢查。此檢查既簡單又安全，它常用於手術的第一個步驟。按檢查及診斷結果，醫生可能會在同一手術進行其他外科治療。

治療成效

預期效果會視乎不同的適應症而定，此檢查可減低手術期間的不適及疼痛，並可減低病人的不安及恐懼，它是手術前評估病人的重要一環，例如可用於眼部或盆腔檢查、膀胱鏡檢查、子宮鏡及刮除術或骨科鏡檢查等。

檢查過程

1. 通常在全身麻醉下進行
2. 進行檢查及相關的外科手術及治療

可能出現的風險及併發症

1. 感染
2. 傷口出血
3. 與麻醉相關的併發症(例如噁心及嘔吐、肺部感染、死亡(罕見))

** 可能出現之風險或併發症未能盡錄。病人應明白無論手術如何妥善，仍有出現併發症的風險。

檢查前的預備

1. 醫生會預先向病人解釋麻醉下檢查後可能找出的病症，施行程序的原因、過程及可能出現之併發症，病人明白後便可簽署同意書。只有在病人簽署同意書後，醫生才會施行相關手術。
2. 請告知醫生及護士所有以往病歷、曾進行過的手術、最近所服用的藥物及因藥物或麻醉劑而引致的併發症。
3. 程序前6小時禁止飲食。
4. 請脫下身上所有衣物(例如內衣褲、假牙、飾物和隱形眼鏡等)，然後換上手術衣。
5. 檢查前請先排清小便。

檢查後須知

一般情況

1. 全身麻醉後:
 - 病人可能會因麻醉時插管而引致喉部輕微不適或疼痛；
 - 病人可能會感到疲倦、渴睡、噁心、甚至嘔吐，如情況持續或加劇，請通知護士。
2. 待麻醉藥效消退後，便可按指示恢復正常飲食。

出院後注意事項

1. 如檢查部位出現嚴重疼痛、大量出血、腫脹、寒顫、發熱(體溫高達 38°C 或 100.4°F 以上)或其他異常情況等，請即聯絡主診醫生或回院診治。
2. 請於指定日期、時間及地點覆診。

如病人對此程序有任何疑問或憂慮，請聯絡主診醫生。

經過醫生的悉心診治，相信病人會逐漸康復，並祝生活愉快！

若病人閱讀此單張後有任何查詢，請記下相關問題，以便醫生作出跟進。

由仁安醫院手術室管治委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢
本院保留一切刪改此單張之權利，而不作另行通知