



检查资料

倾斜床检查 Tilt Table Test

简介


倾斜床检查用以诊断患者是否患有血管迷走神经性晕厥（经常性晕厥），这是一类自主神经系统的问题，因身体对肾上腺素的刺激产生异常反应，使血压或心跳突然下降，引致晕厥。

预期效果

此检查能诊断血管迷走神经性晕厥。一经诊断，可能有针对性的治疗。如没有进行此项检查，或未必能准确判断晕厥的原因。

检查过程

1. 患者需平卧在倾斜床上，医护人员会用束缚带将患者固定。
2. 医护人员会定时监测患者的血压和心电图。
3. 平卧一段时间后，将倾斜床调校至接近直立水平，患者需站在脚踏上。
4. 若患者在站立期间出现晕厥、休克或血压骤降等状况，医护人员便会立即把倾斜床调回平卧及停止此项检查。通常患者会很快复原。
5. 若患者在站立期间没有出现以上状况，医生可能会处方定量的硝酸甘油让患者舌下含服。用药后，患者可能会出现短暂的头疼或恶心。
6. 此检查约需 90 分钟。



图片来源:

<https://www.advancedcardiovascular.org/services-williamsburg/cardiac-diagnostic-testing/tilt-table-testing/>

可能出现的风险及并发症

1. 暂时性心脏停顿

** 可能出现的风险或并发症未能尽录。患者应明白无论检查如何妥善，仍有出现并发症的风险。

检查前的准备

1. 医生会向患者解释做检查的原因、过程及可能出现之并发症，患者明白后便须签署同意书。
2. 请告知医生及护士所有以往病史、曾进行过的手术、最近所服用的药物，及因药物或麻醉剂而引致的并发症。
3. 如果患者在检查前已知有以下任何情况，请告知医生和护士：
 - 怀孕
 - 左心室流出道梗阻或肥厚型心肌病
 - 脑血管疾病（曾经中风）
 - 二尖瓣狭窄
 - 心脏、肾脏或肝脏衰竭
4. 检查前 4-6 小时禁止饮食。
5. 检查可在门诊或住院进行。
6. 请按照医生指示停止服药。（如适用）
7. 请由亲友陪同前来检查。
8. 请除去身上所有衣物(如内衣裤、假牙、饰物和隐形眼镜等)，换上手术衣。
9. 检查前请先排清小便。

检查后须知

1. 患者需要休息二十至三十分钟，医护人员同意后方可出院。
2. 如无不妥，便可恢复正常饮食。
3. 如因检查而停用某些药物，请按照医生指示恢复服用或继续停用该药物。

如您对此检查有任何疑问或忧虑，请联络主诊医生。

经过医生的悉心治疗，相信您会逐渐康复。

若您阅读此章程后有任何查询，请记下相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知