



检查资料

小肠灌肠造影 Small Bowel Enema

简介

小肠灌肠造影是一个放射诊断检查，由放射科医生用钡造影剂及甲基纤维素以透视造影的方式为小肠造影。

适应症

如果患者出现下列症状或有以下疑虑，主诊医生可能会建议患者做小肠灌肠造影：

- 腹泻
- 贫血或消化道出血
- 小肠部分阻塞
- 吸收不良
- 腹部有肿块
- 克隆氏症

检查过程

1. 先麻醉患者的咽喉。
2. 医生会经透视造影将一条鼻胃管经鼻孔插入十二指肠。
3. 钡造影剂和甲基纤维素(约 1.5 至 2 公升,根据患者小肠的大小而定)将通过导管注射入患者的小肠。
4. 由于甲基纤维素使小肠胀大，患者可能会感到腹部不适。
5. 患者需转换不同位置以助进行连串 X 光摄影。

可能出现的风险及并发症

1. 罕见且严重的并发症：
 - 吸入性肺炎
 - 小肠穿孔导致钡造影剂和甲基纤维素渗漏

** 可能出现之风险或并发症未能尽录。患者应明白无论过程如何妥善，仍有出现并发症的风险，并可能需要进行另一手术治疗这些并发症。

检查前的准备

1. 医生会向患者解释检查的原因、过程及可能出现之并发症，患者明白后便须签署同意书。
2. 请告知医生及护士所有以往病史、曾进行过的手术、最近所服用的药物及因药物或麻醉剂而引致的并发症。
3. 现正或怀疑怀孕的女士，请于检查前通知放射科职员。
4. 请携同所有旧片及报告以咨参考。
5. 如患者最近曾进行大肠组织活检，请在抽组织后最少七天再进行本检查。
6. 检查前两天的饮食请以低纤维食物为主。
7. 检查前6小时禁止饮食。
8. 请除去身上衣物(如内衣、假牙和饰物等)，换上手术衣。
9. 检查前请先排清小便。

检查后须知

1. 检查后几天请多喝水以加快显影剂从体内排出。
2. 患者有可能因注入大量液体而觉得恶心及腹泻。
3. 可以恢复正常活动或遵医嘱。

如您对此检查任何疑问或忧虑，请联络主诊医生。

经过医生的悉心诊治，相信您会逐渐康复。

若您阅读此章程后有任何查询，请记下相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知