


## 手術資料

### 剖腹產手術(Caesarean Section)

#### 適應症

前胎剖腹產/曾進行子宮肌瘤切除術/生產過程緩慢/引產失敗/胎位不正/其他\_\_\_\_\_



#### 手術過程

1. 半身/全身麻醉
2. 切開腹部，進入腹腔
3. 切開子宮
4. 娩出嬰兒及胎盤
5. 縫補子宮及腹部傷口
6. 倘若發現輸卵管、卵巢或子宮腔的其他器官異常，可能會同時處理

#### 可能出現的風險及併發症

1. 與手術有關之併發症
    - i) 出血：大量出血時可能需要輸血；倘若出血不止，或需要進行子宮切除手術
    - ii) 附近器官受損，例如膀胱、尿道及腸道等
    - iii) 傷口併發症，例如感染、血腫、傷口癒合欠佳而需要再次縫補
    - iv) 血管栓塞
    - v) 小腸氣
    - vi) 腸臟癱瘓
    - vii) 羊水入血
  2. 與新生兒有關的併發症
    - i) 割傷嬰兒/骨折
    - ii) 嬰兒呼吸窘迫症
  3. 對將來懷孕的影響

若進行前胎剖腹產後之陰道分娩，會有少許子宮疤痕破裂的風險，將來分娩時需要再次進行剖腹產手術的機會亦會增加，同時在下次懷孕時可能會增加胎盤前置、產前出血及胎盤植入的風險。
- \*\* 可能發生之風險或併發症未能盡錄。病人應明白無論手術安排如何妥善，仍有發生併發症的風險。如附近器官受損、手術後嚴重出血或滲漏時，可能需要進行另一手術治療這些併發症。

## **手術前的預備**

1. 醫生會解釋手術原因、程序及可能發生的併發症，病人明白後便可簽署同意書。
2. 手術前一晚須沐浴及洗髮，由護理人員協助清潔腹部皮膚及剃掉腹部和陰部的毛髮。
3. 於手術前 6-8 小時開始禁食及飲水。
4. 除去身上所有衣物(包括內衣褲)和物件，例如假牙、飾物和隱形眼鏡等，換上手術衣著。
5. 往手術室前先排清小便。

## **手術後須知**

1. 全身麻醉後，病人或會感到疲倦、渴睡、噁心及嘔吐，如情況持續或加劇，請通知護士。
2. 如感到傷口痛楚，請通知護士，可按醫生指示注射止痛針或服用止痛藥。

## **出院後注意事項**

1. 藥物: 請根據醫囑服用醫生處方之止痛藥。
2. 如傷口部位痛楚加劇或出現紅腫、觸痛、有濃性滲液、滲血、腹痛加劇、陰道大量出血、發熱(體溫 38°C 或 100°F 以上)等，請即聯絡主診醫生或回院診治。
3. 覆診: 請於指定日期、時間到醫生指定的地點覆診。

備註：如有任何查詢，請聯絡你的醫生。

由仁安醫院手術同意書工作委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢  
本院保留一切更改或刪改此單張之權利，而不作另行通知