

## 手术资料


### 剖腹产手术(Caesarean Section)

#### 适应症

前胎剖腹产/曾进行子宫肌瘤切除术/生产过程缓慢/  
引产失败/胎位不正/其它\_\_\_\_\_

#### 手术过程

1. 半身/全身麻醉
2. 切开腹部，进入腹腔
3. 切开子宫
4. 取出婴儿及胎盘
5. 缝合子宫及腹部切口
6. 倘若发现输卵管、卵巢或子宫腔的其它器官异常，可能会同时处理



#### 可能出现的风险及并发症

1. 与手术有关之并发症
    - i) 出血：大量出血时可能需要输血；倘若出血不止，或需要进行子宫切除手术
    - ii) 附近器官受损，例如膀胱、尿道及肠道等
    - iii) 刀口并发症，例如感染、血肿、刀口愈合欠佳而需要再次缝合
    - iv) 血管栓塞
    - v) 小肠疝气
    - vi) 肠脏瘫痪
    - vii) 羊水入血
  2. 与新生儿有关的并发症
    - i) 割伤婴儿/骨折
    - ii) 婴儿呼吸窘迫症
  3. 对将来怀孕的影响

若进行前胎剖腹产后之阴道分娩，会有极少可能出现子宫疤痕破裂的风险，将来分娩时需要再次进行剖腹产手术的机会亦会增加，同时在下次怀孕时可能会增加胎盘前置、产前出血及胎盘植入的风险。
- \*\* 可能出现之风险或并发症未能尽录。患者应明白无论手术如何妥善，仍有出现并发症的风险。如附近器官受损、手术后严重出血或渗漏时，可能需要进行另一手术治疗这些并发症。

## **手术前的准备**

1. 医生会解释手术原因、程序及可能出现的并发症，患者明白后便可签署同意书。
2. 手术前一晚须沐浴及洗发，由护理人员协助清洗腹部皮肤及剃掉腹部和阴部的毛发。
3. 于手术前 6-8 小时开始禁食及禁止饮水。
4. 脱去身上所有衣物(包括内衣裤)，摘掉假牙、饰物和隐形眼镜等，换上手术衣。
5. 往手术室前先排清小便。

## **手术后须知**

1. 全身麻醉后，患者或会感到疲倦、渴睡、恶心及呕吐，如情况持续或加剧，请通知护士。
2. 如感到刀口疼痛，请通知护士，可按医生指示注射止痛针或服用止痛药。

## **出院后注意事项**

1. 药物: 请根据医嘱服用医生处方之止痛药。
2. 如伤口部位疼痛加剧或出现红肿、触痛、有浓性渗液、渗血、腹痛加剧、阴道大量出血、发热(体温 38°C 或 100°F 以上)等，请即联络主诊医生或回院诊治。
3. 复诊: 请于指定日期、时间到医生指定的地点复诊。

备注：如有任何查询，请联络您的医生。

由仁安医院手术同意书工作委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询  
本院保留一切更改或删改此章程之权利，而不作另行通知