



手术资料

关节积液抽吸术 Aspiration of Joint Fluid

简介

关节积液抽吸术是一项利用抽吸器抽出关节积液的手术，将抽出的积液送到病理部进行细菌培养及化学测试。

治疗效果

有助治疗关节肿痛及诊断关节炎的成因，例如感染、痛风及类风湿。此外，也可减低因患处积液而造成的疼痛。

手术过程

1. 手术序会在局部麻醉下进行；
2. 使用消毒液清洗患处；
3. 把附有针头的注射器放入关节抽积液；
4. 取出注射器，用防水敷料覆盖；
5. 将抽出的积液送到病理部化验。


可能出现的风险及并发症

1. 局部瘀伤
2. 少量伤口出血，附近位置可能瘀肿
3. 感染性关节炎(罕有)

** 可能出现之风险或并发症未能尽录。患者应明白无论程序如何妥善，仍有出现并发症的风险。

手术前的准备

1. 保持个人卫生可预防感染。
2. 医生会向患者解释手术的原因、过程及可能出现之并发症，患者明白后便须签署同意书。
3. 请告知医生及护士所有以往病史、曾进行过的手术、最近所服用的药物及因药物或麻醉剂而引致的并发症。如正服用影响血液凝固的药物，例如阿斯匹林(Aspirin)、华法林(Warfarin)、拜瑞妥(Xarelto)或百达生(Pradaxa)或非类固醇抗炎药，例如布洛芬(Ibuprofen)、萘普生(Naproxen)及中药，请尽早通知医生。
4. 已怀孕或怀疑怀孕的女士需预先通知医生。



图片来源:

https://media.springernature.com/lw685/springer-static/image/chp%3A10.1007%2F978-3-030-85047-0_115/MediaObjects/209926_2_En_115_Fig1_HTML.jpg

手术后须知

1. 应保持抽吸处清洁干燥，并按医生指示摘掉敷料。
2. 术后可能会有轻微出血及不适，如有需要，可服医生处方止痛药。

出院后注意事项

1. 手术后数天内可能会感到关节痛、不适或患处出现瘀伤，此属正常现象，并会在随后逐渐消退。
2. 按医生指示冰敷，能有效减低疼痛及关节肿胀。
3. 如抽吸处异常疼痛、发红及肿大、出血或流出分泌物、寒颤、发烧(体温高达 38°C 或以上)或其他异常情况，请即联络主诊医生或回院治疗。
4. 康复初期可使用拐杖助行。
5. 请按时复诊。

如您对此手术有任何疑问或忧虑，请联络主诊医生。

经过医生的悉心治疗，相信您会逐渐康复，并祝生活愉快！

若您阅读此章程后有任何查询，请记下相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好!

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知