仁安醫院
UNION HOSPITAL

请扫描以下二维码以获取电子档案。

手术资料

睪丸切除术
Orchidectomy

简介

睪丸切除术是一项外科手术，手术切除一侧或两侧睪丸。睪丸位于阴茎下方、阴囊内，是制造精子和称为睪丸素的雄性激素的器官。此手术的适应症包括：

- 癌症：睪丸癌、前列腺癌及男性乳癌；
- 创伤：运动受创、摩托车意外或其他事故导致睪丸严重受损;
- 睪丸扭转：供血予睪丸的精索扭曲而导致睪丸永久受损及坏死；
- 严重感染：在极罕有情况下，抗生素未能发挥作用；
- 隐睪：因睪丸萎缩而引致。



图片来源:
https://en.wikipedia.org/wiki/Orchiectomy

治疗效果

手术能有效诊断出睪丸癌。如属早期患者，睪丸切除术可治愈睪丸癌。大多数前列腺癌或男性乳癌患者于手术后可缓解症状、增加存活率及缩小肿瘤。

手术过程

1. 手术在全身麻醉下进行；
2. 患者需平躺在手术床上；
3. 在阴囊或腹股沟切口；
4. 经切口取出睪丸及精索；
5. 缝合；
6. 用无菌敷料覆盖。

可能出现的风险及并发症

1. 刀口出血或血肿 (<2%)：如出血严重，患者可能需接受输血或其他手术
2. 刀口感染 (<1%)
3. 阴囊暂时性肿胀
4. 静脉血栓栓塞：可引致深层静脉血栓塞(<1%)、肺栓塞、中风及心脏病发
5. 不育：如两侧睪丸均被切除
6. 由于睪丸素的缺乏（去除两侧睪丸）引起的其他副作用：根据手术的不同，这些症状包括勃起功能障碍、性欲减退、潮热、抑郁、情绪波动、体重增加、乳房增大，以及肌肉流失。

** 可能出现之风险或并发症未能尽录。患者应明白无论手术如何妥善，仍有出现并发症的风险。如附近器官受损、手术后严重出血或渗漏时，可能需要进行另一手术治疗这些并发症。

COPYRIGHT UNION HOSPITAL

手术前的准备

1. 保持个人卫生可预防刀口感染。患者在手术当天务必洗澡及洗头。
2. 医生会向患者解释手术的原因、过程及可能出现之并发症，患者明白后便须签署同意书。
3. 请告知医生及护士所有以往病史、曾进行过的手术、最近所服用的药物，及因药物或麻醉剂而引致的并发症。如正服用影响血液凝固的药物，例如阿斯匹林(Aspirin)、华法林(Warfarin)、拜瑞妥(Xarelto)或百达生(Pradaxa)及中药，请尽早通知医生。
4. 如有需要，医护人员会安排患者进行常规检查，如血液测试、心电图检查、电脑扫描或睾丸肿块超声波等。
5. 护理人员会按需要为患者剃掉手术部位的毛发。
6. 医生会在患者的皮肤上标记手术位置，请勿洗掉。
7. 术前 6 小时禁止饮食。
8. 请除去身上所有衣物(如内衣裤、假牙、饰物和隐形眼镜等)，换上手术衣。
9. 手术前请先排清小便。

手术后须知

一般情况

1. 全身麻醉后，患者可能会:
   - 因麻醉时曾插管而引致喉部轻微不适或疼痛；
   - 出现麻醉药的副作用，包括疲倦、渴睡、恶心或呕吐，如情况持续或加剧，请通知护士。
2. 如刀口部位疼痛，可通知护士，护士会按医生指示为患者注射止痛针或提供口服止痛药。

刀口护理

1. 请保持刀口清洁及干爽，如有渗液或出血情况，请即通知护士。
2. 敷料可在手术后 24 小时摘除，然后可如常淋浴，请勿使刀口部位在水中长时间浸泡，淋浴后务必轻轻印干 (切勿擦拭)。
3. 缝线会在 2-3 星期内自动溶解。
4. 腹股沟和阴囊部位出现瘀伤和肿胀是正常的，通常会逐渐消退。在恢复期间，应穿较贴身的内裤。如有需要，请按医生指示配戴阴囊托带，以缓解肿胀及疼痛。

饮食

1. 麻醉药作用消退后，便可按医护人员指示逐步恢复正常饮食。
2. 应摄取足够的蔬菜及纤维，以防便秘。

出院后注意事项

1. 请按照医生指示服药。
2. 术后首 4-6 星期内，请勿提重物或做剧烈运动。
3. 正常情况下，手术后数天可恢复工作。若患者的工作需要体力劳动，则需较长时间才可复工。
4. 一般情况下，手术后一星期便可恢复少量活动。
5. 如刀口部位出血或渗脓、肿胀或疼痛增加、寒颤、发烧(体温高达 38°C 或以上)或其他异常情况，请即联络主诊医生或回院治疗。
6. 请按时复诊。

COPYRIGHT UNION HOSPITAL

如您对此手术有任何疑问或忧虑，请联络主治医生。

经过医生的悉心治疗，相信您会逐渐康复。

若您阅读此章程后有任何查询，请记下相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

_____

_____

_____

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知

COPYRIGHT UNION HOSPITAL