



手术资料

金属线定位切除术 Wire Localization Excision

简介

金属线定位切除术可在乳房 X-光造影或超声波的导引下，确定未能触摸到的乳房病变位置，然后手术切除。

治疗效果

手术可以把未能触摸到的乳房肿瘤或钙化点切除及确诊。

手术过程

1. 定位过程会由放射科医生在局部麻醉下进行。
2. 放射科医生在超声波或乳房 X-光造影的辅助下，置入一条细长的金属线到乳房的病变部位。
3. 扣上金属线末端的小钩，以防金属线松脱。
4. 置入金属线定位后，伤患者送往手术室在全身麻醉下切除乳房病变部分。

可能出现的风险及并发症

1. 刀口出血
2. 刀口感染
3. 永久性疤痕
4. 金属线脱落(不常见)

** 可能出现之风险或并发症未能尽录。患者应明白无论治疗如何妥善，仍有出现并发症的风险。如附近器官受损、治疗后严重出血或渗漏时，可能需要进行另一手术治疗这些并发症。

手术前的准备

1. 保持个人卫生可预防刀口感染。患者于治疗当天务必洗澡及洗头。
2. 医生会向患者解释治疗的原因、过程及可能出现之并发症，患者明白后便须签署同意书。
3. 请告知医生及护士所有以往病史、曾进行过的手术、最近所服用的药物及因药物或麻醉剂而引致的并发症。
4. 医生可能会处方手术前驱药物或静脉输液。
5. 术前6至8小时禁止饮食。
6. 请除去身上所有衣物(如内衣裤、假牙、饰物和隐形眼镜等)，换上手术衣。
7. 术前请先排清小便。

手术后须知

一般情况

1. 全身麻醉后，患者可能会：
 - 因麻醉时曾插管而引致喉部轻微不适或疼痛；
 - 出现麻醉药的副作用，包括疲倦、渴睡、恶心或呕吐，如情况持续或加剧，请通知护士。
2. 如刀口部位疼痛，可通知护士，护士会按医生指示为患者注射止痛针或提供口服止痛药。
3. 置入金属线后，为防止金属线脱落，请勿进行任何活动。

伤口处理

1. 应保持刀口清洁干燥。
2. 治疗后宜穿宽松衣物，以免伤口受压。

出院后注意事项

1. 如刀口部位的疼痛加剧及出现红肿、触痛、有浓性渗液或渗血、寒颤、发烧(体温高达 38°C 或以上)或其他异常情况，请即联络主诊医生或回院治疗。
2. 请按时复诊。

如您对此手术有任何疑问或忧虑，请联络主诊医生。

经过医生的悉心诊治，相信您会逐渐康复。

若您阅读此章程后有任何查询，请记下相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知