



牙科治疗资料

植牙 Dental Implant

简介

植牙是把钛金属植入牙槽骨内，以填补失去的牙齿。此治疗较采用镶配活动假牙或牙桥舒适。牙科医生会根据颚骨的情况，而决定嵌入植体的类型及程序，请与牙科医生商讨最合适的治疗方法。



- 优点：
1. 不需磨损邻近牙齿。
 2. 近似真牙齿，美观性高。
 3. 保持自然的骨骼架构以减轻骨骼因缺乏刺激而造成的萎缩。
 4. 高稳定性与舒适度。

- 缺点：
1. 价钱比较昂贵。
 2. 需要接受小手术。
 3. 并非每个人都适合接受植牙。

治疗效果

目的是填补多只或全部失去的牙齿，支撑及固定假牙（例如假牙托、牙桥或牙冠）。

治疗过程

I. 一般植牙过程：

1. 此治疗会于局部麻醉、静脉注射镇静剂或全身麻醉下进行(麻醉方法会由牙科医生决定)。
2. 翻开牙龈，在预定的位置及角度钻孔，嵌入植体，然后把牙龈缝合。
 - 在三至六个月内，牙槽骨会和植体愈合，连结成一体。这时便可把植体上的一块牙龈切除，然后在植体套上牙龈愈合装置，让环绕着植体的牙龈愈合。
 - 当牙龈愈合后，换上印模装置，以便把植体的位置及角度复印到牙模上。
 - 把假牙固定在植体上。

II. 一次性手术治疗

1. 手术是在同一次手术中嵌入植体并装上愈合装置，不需进行另一次牙龈手术。
2. 拔牙后实时放入植体。

治疗前的准备

医生会为患者作详细检查后才决定嵌入钛植体的合适位置，也会向患者解释治疗的原因、过程及可能出现的并发症，患者明白后便须签署同意书。

植牙后的注意事项

1. 必须彻底清洗牙齿，避免环绕着植体的牙龈发炎，导致植体松动。
2. 接受植牙手术后，患者必须定期约见牙科医生，接受跟进和洗牙以保持口腔卫生。
3. 植体及牙冠会有一年的保养期。
4. 如感到呼吸不畅、过量出血、持续恶心或呕吐、不寻常的伤口疼痛、肿胀或发烧等，请立即联络牙科医生或回院治疗。

植牙后的护理

伤口

手术后血凝块会帮助止血及保护伤口，故此不要将血凝块除去，也请遵守以下事项：

1. 当天尽量避免漱口，因漱口会将血凝块冲走。
2. 不要用手指或舌头擦拭伤口。
3. 如口中混有血丝可咽下，请勿试图用漱口形式漱出。
4. 如出血不止，可将清洁的纱布卷成一小块放在伤口处，咬紧约三十分钟，有助止血。
5. 若使用上列第4项的方法仍未能止血，请立即联络牙科医生或回院治疗。
6. 进行小型口腔手术后，如出现面部肿胀、腮或面颌及颈下皮肤出现瘀青、张嘴困难等，均属正常现象，无须惊慌，此情况会于数天后消失。

饮食

1. 局部麻醉药会令口腔肌肉出现暂时性的麻木感，故此药的作用未消散前，请勿吃东西。
2. 请勿喝酒精类饮品及任何热饮。
3. 二十四小时后，饭后可把暖盐水含在口中数分钟以作冲洗。

其他

1. 请勿做体力运动或工作。
2. 必须按指示服药。

静脉注射镇静剂后之注意事项

1. 二十四小时内，请勿：
 - 喝含酒精类饮品，因酒精可加重麻醉药的昏睡及其他副作用。
 - 驾驶车辆、煮食及使用带危险性的设备或工具。
 - 作出任何重要决定或签署任何法律文件，因麻醉药物可短暂性地影响思维及记忆力。
2. 只可服医生处方的药物。
3. 手术后，可能会感到眩晕或昏睡，建议在亲友陪同下方可离开医院。

如您对此手术有任何疑问或忧虑，请联络牙科医生。

经过牙科医生的悉心诊治，相信您会逐渐康复。

若您阅读此章程后有任何查询，请记下相关问题，以便牙科医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知

