



手术资料

疣电烙术 Cauterization of Warts

简介

疣属良性皮肤增生，由于皮肤表层受病毒(人类乳头瘤病毒)感染而引致。疣病毒具传染性，可通过接触或触摸而传播。

有多种方法可以治疗疣，通常会根据患者的状况及疣的种类而决定，若其他治疗方法无效，手术则会是最快及安全的选择，最常见的手术包括外科电刀及刮除术，以及激光手术。

治疗效果

疣可被切除，但不能彻底破坏病毒，所以会有可能复发，或在其他部位长出新疣。治疗前请联络您的医生商讨及订立治疗方案。

治疗过程

1. 治疗会在局部麻醉下进行
2. 外科电刀及刮除术
用电刀烧灼患处，然后使用刀或小工具切除疣
- 激光手术
利用激光烧灼疣
3. 用无菌敷料覆盖伤口

可能出现的风险及并发症

1. 伤口感染
2. 伤口出血
3. 形成疤痕
4. 烧伤

** 可能出现之风险或并发症未能尽录。患者应明白无论手术如何妥善，仍有出现并发症的风险。如手术后出现严重并发症时，可能需要进行其他治疗程序以处理这些并发症。

治疗前的准备

1. 保持个人卫生可预防伤口感染。
2. 医生会向患者解释治疗的原因、过程及可能出现之并发症，患者明白后便须签署同意书。
3. 请告知医生及护士所有以往病史、曾进行过的手术、最近所服用的药物及因药物或麻醉剂而引致的并发症。

出院后注意事项

1. 为防止感染，伤口必须保持清洁，需要用防水敷料覆盖数天。
2. 治疗部位周边会形成软痂，软痂会自行脱落及留下小痂。
3. 首 24 小时伤口可能会有出血现象，可轻轻按压出血处十分钟止血。
4. 以下是预防疣传播的建议：
 - 请勿挖或刮疣
 - 请勿触摸其他人的疣
 - 保持足疣干燥
 - 在公众浴室、更衣室及泳池应穿鞋
5. 如伤口部位大量出血、疼痛、肿胀、发红及渗水、疣附近皮肤发红及热、寒颤、发烧(体温高达 38°C 或以上)或其他异常情况，请即联络主诊医生或回院治疗。
6. 请按时复诊。

如您对此手术有任何疑问或忧虑，请联络主诊医生。

经过医生的悉心诊治，相信您会逐渐康复，并祝生活愉快！

若您阅读此章程后有任何查询，请记下相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知