



治疗资料

痔疮注射疗法 Injection of Haemorrhoid

简介

痔疮是由肛门附近的血管组织-肛垫胀大而成，实际成因不明，但与便秘、怀孕、年龄和基因等有密切关系。典型的症状是直肠出血、疼痛或脱垂。

痔疮分为内痔和外痔，内痔位于肛门内，对上约 1-2 厘米；外痔则位于肛门外缘。轻度的内痔可以使用注射治疗，使痔疮干枯及止血。注射疗法通常可在门诊进行。如有需要，隔六周后可再次注射。

治疗效果

可治疗由痔疮所引致的症状，有助减低不适、疼痛及预防进一步的并发症。完成后痔疮便会枯萎及变小。

治疗过程

1. 可在没有麻醉下进行；
2. 把油剂注射在痔疮内，使其萎缩及干枯。

可能出现的风险及并发症

1. 感染
2. 伤口出血
3. 脓肿

** 可能出现之风险或并发症未能尽录。患者应明白无论治疗过程如何妥善，仍有出现并发症的风险。

治疗前的准备

医生会向患者解释治疗的原因、过程及可能出现之并发症，患者明白后便须签署同意书。

出院后注意事项

1. 注射后，直肠可能会有轻微不适及出血现象。
2. 发炎的痔疮会在数天内消退，如有需要，可按医生处方服止痛药。
3. 首 3 天可能会有少量出血或不适现象。
4. 为防止便秘，建议多吃高纤食物及多喝水，必须在治疗后的 2 至 3 天内排便。
5. 如出现严重疼痛、持续或大量出血、肛门流出大量分泌物、便秘多于 3 天、排尿困难、恶心或呕吐、寒颤、发烧(体温高达 38°C 或以上)或其他异常情况，请即联络主诊医生或回院治疗。
6. 请按时复诊。

伤口护理

如厕时，应：

- 避免用力过度，使痔疮恶化。
- 排便后使用湿纸巾或婴儿湿纸巾代替干纸巾擦肛门。
- 以轻拍形式擦肛门，切勿来回擦拭。

如您对此治疗有任何疑问或忧虑，请联络主诊医生。

经过医生的悉心诊治，相信您会逐渐康复，并祝生活愉快！

若您阅读此章程后有任何查询，请记下相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知