



程序资料

痔疮结扎 Haemorrhoid Banding

简介

痔疮是由肛门附近的血管组织-肛垫胀大而成，实际成因不明，但与便秘、怀孕、年龄和基因等有密切关系。典型的症状是直肠出血、疼痛或脱垂。痔疮分为内痔和外痔，内痔位于肛门内上约 1-2 厘米，外痔则位于肛门外缘。轻度的内痔可以使用橡皮圈结扎，阻断血流，使痔疮萎缩及自动脱落。此治疗方法可在不使用麻醉药的情况下进行。

治疗效果

可治疗由痔疮所引致的症状，有助减低不适、疼痛及预防进一步的并发症。完成后痔疮便会萎缩及自动脱落。

治疗过程

1. 医生会先将直肠内视镜插进肛门检查，找出痔疮组织。
2. 然后于痔疮组织的根部套上橡皮圈，有需要时或会于多处进行结扎。
3. 整个过程简单，约 10 分钟内便可完成。

可能出现的风险及并发症

1. 感染
2. 伤口出血
3. 排尿困难

** 可能出现之风险或并发症未能尽录。患者应明白无论过程如何妥善，仍有出现并发症的风险。

治疗前的准备

医生会向患者解释施行治疗的原因、过程及可能出现之并发症，患者明白后便须签署同意书。

出院后注意事项

1. 治疗后会有轻微疼痛，但大部分患者可实时走动及恢复日常活动。
2. 肛门可能会有胀满、**排便不清的感觉**，此时可服止痛药缓解，并紧记切勿强行排便，而此情况通常会于 2-3 天内恢复正常。
3. 温水坐浴可减轻不适症状。温水坐浴方法：用坐浴盆或浴缸盛温水，将整个臀部坐入盆内 5-10 分钟，浴后用干净毛巾将肛门周围擦干即可。
4. 因痔疮结扎的原理是用橡皮圈阻断血流，而干枯的痔疮组织及橡皮圈会随着大便自动排出体外，期间可能会有微量出血情况，不必担心。
5. 如出现严重的肛门或直肠不适、直肠大量出血、排尿困难、寒颤、发烧(体温高达 38°C 或以上)或其他异常情况，请即联络主诊医生或回院治疗。
6. 请按时复诊。

如您对此手术有任何疑问或忧虑，请联络主诊医生。

经过医生的悉心诊治，相信您会逐渐康复，并祝生活愉快！

若您阅读此章程后有任何查询，请记下相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知