



程序資料

超聲波尿道增強排尿造影 Contrast-enhanced Voiding Urosonography

簡介

超聲波尿道增強排尿造影是一個利用超聲波及超聲波造影劑來檢查泌尿系統是否正常的檢查。檢查將由放射科醫生以超聲波造影進行。

適應症

如果病人出現下列病徵或有以下疑慮，主診醫生可能會建議病人進行超聲波尿道增強排尿造影：

- 尿道感染
- 排尿困難
- 腎積水
- 膀胱輸尿管反流
- 血尿

檢查過程

1. 放射科醫生會為病人下陰位置消毒；
2. 一條軟導管經尿道置入膀胱，並用小氣球固定；
3. 造影劑將會被緩慢地注入尿道及膀胱；
4. 醫生會進行超聲波造影以檢查尿道及膀胱；
5. 其後會在超聲波造影下觀察排尿過程。

可能出現的風險及併發症

1. 置入膀胱導管的風險及併發症 (0.8%)：
 - 置入導管時尿道或膀胱受損
 - ◇ 排尿困難
 - ◇ 血尿
 - ◇ 尿液殘留
 - ◇ 尿道感染
 - ◇ 血液和粘液分泌物排出
 - ◇ 會陰刺激
 - ◇ 腹部或尿道不適
 - ◇ 焦慮哭泣/嘔吐
 - ◇ 導管誤入陰道或異位尿道口
2. 超聲波造影劑的風險及併發症：
 - 沒有明顯的臨床不良事件歸因於超聲波造影劑

****** 可能發生之風險或併發症未能盡錄。病人應明白無論程序如何妥善，仍有發生併發症的風險，並可能需要進行另一手術治療這些併發症。

程序前的預備

1. 醫生會向病人解釋施行程序的原因、過程及可能出現之併發症，病人明白後便可簽署同意書。
2. 請告知醫生及護士所有以往病歷、曾進行過的手術、最近所服用的藥物及因藥物或麻醉而引致的併發症。
3. 請攜同所有舊片及報告以諮參考。
4. 請脫下身上所有衣物(例如內衣褲、假牙和飾物等)，然後換上手術衣。
5. 請替幼童帶備尿片及衣服以作替換。
6. 如主診醫生有為檢查處方藥物，請遵循服用。

程序後須知

1. 檢查後數天尿液可能會帶輕微粉紅色。
2. 檢查後數天排尿時可能會有輕微不適。
3. 病人可以恢復正常活動或遵循主診醫生的指示。

如病人對此程序有任何疑問或憂慮，請聯絡醫療造影部。

經過醫生的悉心診治，相信病人會逐漸康復，並祝生活愉快！

若病人閱讀此單張後有任何查詢，請記下相關問題，以便醫生作出跟進。

由仁安醫院手術室管治委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢
本院保留一切刪改此單張之權利，而不作另行通知