



## 检查资料

### 超声波尿道增强排尿造影

### Contrast-enhanced Voiding Urosonography

#### 简介

超声波尿道增强排尿造影是一个利用超声波及超声波造影剂检查泌尿系统是否正常的检查。检查由放射科医生以超声波造影进行。

#### 适应症

如果患者出现下列症状或有以下疑虑，主治医生可能会建议患者进行超声波尿道增强排尿造影：

- 尿道感染
- 排尿困难
- 肾积水
- 膀胱输尿管反流
- 血尿

#### 检查过程

1. 放射科医生会为患者下阴部位消毒；
2. 将一条软导管经尿道置入膀胱，并用小气球固定；
3. 将造影剂注入尿道及膀胱；
4. 医生会进行超声波造影检查尿道及膀胱；
5. 其后会在超声波造影下观察排尿过程。

#### 可能出现的风险及并发症

1. 置入膀胱导管的风险及并发症 (0.8%)：
  - 置入导管时尿道或膀胱受损
    - ◇ 排尿困难
    - ◇ 血尿
    - ◇ 尿液残留
    - ◇ 尿道感染
    - ◇ 排出血液和粘液分泌物
    - ◇ 会阴刺激
    - ◇ 腹部或尿道不适
    - ◇ 焦虑哭泣/呕吐
    - ◇ 导管误入阴道或异位尿道口
2. 超声波造影剂的风险及并发症：
  - 没有明显的因超声波造影剂而导致的临床不良事件

\*\* 可能出现之风险或并发症未能尽录。患者应明白无论程序如何妥善，仍有发生并发症的风险，并可能需要进行另一手术治疗这些并发症。

## 检查前的准备

1. 医生会向患者解释检查的原因、过程及可能出现之并发症，患者明白后便须签署同意书。
2. 请告知医生及护士所有以往病史、曾进行过的手术、最近所服用的药物，及因药物或麻醉剂而引致的并发症。
3. 请携同所有旧片及报告以供参考。
4. 请除去身上所有衣物(如内衣裤、假牙和饰物等)，换上手术衣。
5. 请替幼儿带备尿不湿及衣服以作替换。
6. 如主治医生有为检查处方药物，请按时服用。

## 检查后须知

1. 检查后数天尿液可能会带轻微粉红色。
2. 检查后数天排尿时可能会有轻微不适。
3. 患者可以恢复正常活动或遵主治医生的指示。

如您对此手术有任何疑问或忧虑，请联络主治医生。

经过医生的悉心治疗，相信您会逐渐康复。

若您阅读此章程后有任何查询，请记住相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

---

---

---

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询  
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知