仁安醫院
UNION HOSPITAL

請掃描以下二維碼以獲取電子檔案。

程序資料

引產須知
Induction of Labour

簡介

引產（俗稱「催生」）是指在孕婦未有作產徵狀時，以人工方式刺激分娩進程。引產方法包括透過使用前列腺素藥物軟化宮頸（PGE2 / Propess）、人工羊膜穿破術（俗稱「穿水」）或使用催產素藥物（Syntocinon）刺激子宮收縮。

引產原因：_____

程序過程

1. 醫生會根據孕婦的妊娠週數、胎兒位置及宮頸成熟度，選擇合適的引產方法。
2. 若孕婦宮頸成熟度不足，醫生或助產士會將前列腺素(PGE2 / Propess)放入陰道使宮頸軟化，逐漸引發宮縮，令宮頸張開。
3. 若宮頸已經成熟，將進行人工羊膜穿破術(俗稱「穿水」)，按需要將催產素(Syntocinon)經由靜脈輸入，以刺激子宮收縮。
4. 整個引產過程需時，期間醫護人員會密切監察孕婦宮縮、胎心率和產程進展。
5. 約 80% 接受引產的孕婦能夠成功經陰道分娩。如果引產進展不順利，醫生會作出評估並決定是否進行剖腹產。

可能出現的風險及併發症

1. 引致宮縮過度頻密，可能導致胎兒宮內窘迫或缺氧
2. 胎膜穿破時間過長，有可能增加子宮感染的風險
3. 增加儀器助產及剖腹產的機會率
4. 引產失敗，需要施行剖腹產
5. 子宮破裂
6. 臍帶脫垂
7. 羊水栓塞

** 可能發生之風險或併發症未能盡錄。產婦應明白無論程序安排如何妥善，仍有發生併發症的風險，可能需要進行另一手術治療這些併發症。

COPYRIGHT UNION HOSPITAL

如產婦對此程序有任何疑問或憂慮，請聯絡主診醫生。

經過醫生的悉心診治，相信產婦會逐漸康復，並祝生活愉快！

若產婦閱讀此單張後有任何查詢，請記下相關問題，以便醫生作出跟進。

_____

_____

_____

由仁安醫院手術室管治委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢
本院保留一切刪改此單張之權利，而不作另行通知

COPYRIGHT UNION HOSPITAL