仁安醫院
UNION HOSPITAL

请扫描以下二维码以获取电子档案。

程序资料

引产须知
Induction of Labour

简介

引产 (俗称「催产」) 是指在孕妇未有临产症状时，以人工方式刺激分娩进程。引产方法包括透过使用前列腺素药物软化宫颈 (PGE2 / Propess)、人工羊膜穿破术 (俗称「破水」) 或使用催产素药物 (Syntocinon) 刺激子宫收缩。

引产原因：_____

程序过程

1. 医生会根据孕妇的妊娠周数、胎儿位置及宫颈成熟度，选择适合的引产方法。
2. 若孕妇宫颈成熟度不足，医生或助产士会将前列腺素(PGE2 / Propess)放入阴道使宫颈软化，逐渐引发宫缩，使宫颈张开。
3. 若宫颈已经成熟，将进行人工羊膜穿破术(俗称「破水」)，按需要静脉输入催产素(Syntocinon)，刺激子宫收缩。
4. 整个引产过程需时，期间医护人员会密切监察孕妇宫缩、胎心率和产程进展。
5. 约 80% 接受引产的孕妇能够成功经阴道分娩。如果引产进展不顺利，医生会评估并决定是否进行剖腹产。

可能出现的风险及并发症

1. 引致宫缩过度频密，可能导致胎儿宫内窘迫或缺氧
2. 胎膜穿破时间过长，有可能增加子宫感染的风险
3. 增加仪器助产及剖腹产的机会率
4. 引产失败，需要施行剖腹产
5. 子宫破裂
6. 脐带脱垂
7. 羊水栓塞

** 可能出现之风险或并发症未能尽录。产妇应明白无论程序安排如何妥善，仍有出现并发症的风险，可能需要进行另一手术治疗这些并发症。

COPYRIGHT UNION HOSPITAL

如您对此程序有任何疑问或忧虑，请联络主治医生。

经过医生的悉心治疗，相信您会逐渐康复。

若您阅读此章程后有任何查询，请记下相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

_____

_____

_____

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主治医生查询
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知

COPYRIGHT UNION HOSPITAL