

## 麻醉資料

### 全身麻醉 General Anaesthesia

#### 簡介

全身麻醉是利用麻醉氣體透過面罩、呼吸道輸氣導管、其他輸氣裝置或靜脈注射令病人在手術中安全地失去意識、知覺或感覺。通常麻醉氣體及靜脈注射藥物會一併使用。在麻醉過程中，麻醉科醫生會利用精密的儀器監測、控制及調節病人的身體機能。麻醉科醫生會精確地計算麻醉的時間及深度，並不斷地按病人的身體狀況作出調整，以確保手術能順利地進行。在手術完成後，麻醉科醫生會安排病人往復甦室待病人恢復意識及知覺。

#### 治療成效

全身麻醉後，病人會進入睡眠狀態，因此不會感受到因手術而帶來的痛楚，從而減低尷尬、不安及焦慮的感覺。

#### 可能出現的風險及併發症

##### 常見：

1. 病人可能會感到疲倦、渴睡、噁心、甚至嘔吐
2. 藥物過敏(出現嚴重反應的機會低於 0.01%)
3. 因長時間卧床使身體部份受壓而產生麻痺，導致皮膚紅腫、潰爛、損害神經，甚至失明
4. 可能因插入呼吸道輸氣導管而出現牙齦、牙齒損傷或喉嚨疼痛，較鬆的牙齒或未能脫下的假牙亦可能會增加插入呼吸道輸氣導管時之風險
5. 若空腹時間不足，會增加吸入性肺炎的風險，嚴重時可致命
6. 在手術中恢復知覺(機會少於 0.3%)
7. 手術後可能會出現尿液滯留的情況，此情況於年長男士中較為常見

##### 不常見：

1. 肺炎
2. 心臟病病發
3. 中風
4. 死亡(罕見)

\*\* 可能出現之風險或併發症未能盡錄。病人應明白無論程序如何妥善，仍有出現併發症的風險。如附近器官受損、手術後嚴重出血或滲漏時，可能需要進行另一手術治療這些併發症及較長的麻醉時間。

#### 麻醉前準備

1. 麻醉科醫生會向病人解釋麻醉程序及可能出現之併發症，病人明白後便可簽署同意書。
2. 麻醉前 6 小時禁止飲食。

如病人對麻醉有任何疑問或憂慮，請聯絡主診醫生。

經過醫生的悉心診治，相信病人會逐漸康復，並祝生活愉快！

若病人閱讀此單張後有任何查詢，請記下相關問題，以便醫生作出跟進。

---

---

---

由仁安醫院手術室管治委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢  
本院保留一切刪改此單張之權利，而不作另行通知

