



手術資料

乳房腫塊組織穿刺檢查 Breast Core Biopsy

簡介

粗針穿刺切片是指透過粗針抽取少量乳房腫塊組織作檢查。此檢查通常利用超聲波導引，在局部麻醉下取出部分乳房腫塊，送往化驗室作活組織化驗。

治療成效

此檢查可用作診斷乳房腫塊性質。

檢查過程

1. 此檢查在局部麻醉下進行，病人完全清醒。
2. 醫生先在乳房腫塊旁的皮膚上，注射局部麻醉藥。
3. 利用小尖刀作一小切口，經切口放入抽取組織儀器上的針，抽取組織作化驗。
4. 一般要抽取 3-4 個樣本作化驗。

可能出現的風險及併發症

1. 穿刺部位出血，形成血腫或瘀青現象
2. 傷口感染
3. 若抽取組織不足，須施行其他組織抽樣檢查
4. 局部麻醉藥過敏反應
5. 經胸腔穿刺可引致氣胸(但較罕見)

** 可能發生之風險或併發症未能盡錄。病人應明白無論手術如何妥善，仍有發生併發症的風險。如附近器官受損、手術後嚴重出血或滲漏時，可能需要進行另一手術來處理這些併發症。

檢查前的預備

1. 醫生會向病人解釋施行手術的原因、程序及可能發生之併發症，病人明白後便可簽署同意書。
2. 請告知醫生及護士所有以往病歷、曾進行過的手術、最近所服用的藥物及因藥物或麻醉而引致的併發症。
3. 手術前不用限制飲食。
4. 宜穿著上下身分開的衣服如恤衫及裙/褲。

檢查後須知

1. 抽取組織後傷口會敷上壓力敷料以助止血。
2. 敷料可於 6-8 小時後除去或依照醫護人員指示處理傷口。
3. 如傷口已貼上防水膠布，病人便可照常淋浴。
4. 傷口將於檢查後 2 至 3 天癒合。乳房穿刺部位出現輕微瘀青屬正常現象，約一星期後會自然消散。
5. 醫生會處方止痛藥，需要時服用。

出院後注意事項

請於指定日期、時間及地點覆診。

如病人對此手術有任何疑問或憂慮，請聯絡主診醫生。

經過醫生的悉心診治，相信病人會逐漸康復，並祝生活愉快！

若病人閱讀此單張後有任何查詢，請記下相關問題，以便醫生作出跟進。

由仁安醫院手術室管治委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢
本院保留一切刪改此單張之權利，而不作另行通知