



手术资料

乳房肿块组织穿刺检查 Breast Core Biopsy

简介

粗针穿刺切片是指透过粗针抽取少量乳房肿块组织作检查。此检查通常用超声波导引，在局部麻醉下取出部分乳房肿块，送往化验室作活组织检验。

治疗效果

此检查可用作诊断乳房肿块性质。

检查过程

1. 此检查在局部麻醉下进行，患者完全清醒。
2. 医生先在乳房肿块旁的皮肤上，注射局部麻醉药。
3. 用小尖刀切一小切口，经切口放入取组织仪器上的针，取组织作检验。
4. 一般要取 3-4 个标本。

可能出现的风险及并发症

1. 穿刺部位出血，形成血肿或瘀青现象
2. 刀口感染
3. 若取出的组织不足，须再次做抽组织手术
4. 局部麻醉药过敏反应
5. 经胸腔穿刺可引致气胸(但较罕见)

** 可能出现的风险或并发症未能尽录。患者应明白无论手术如何妥善，仍有出现并发症的风险。如附近器官受损、手术后严重出血或渗漏时，可能需要进行另一手术来处理这些并发症。

检查前的准备

1. 医生会向患者解释施行手术的原因、过程及可能发生之并发症，患者明白后便须签署同意书。
2. 请告知医生及护士所有以往病史、曾进行过的手术、最近所服用的药物及因药物或麻醉剂而引致的并发症。
3. 手术前不用限制饮食。
4. 宜穿上下身分开的衣服如恤衫及裙/裤。

检查后须知

1. 取组织后刀口会敷上压力敷料以助止血。
2. 敷料可于 6-8 小时后除去或依照医护人员指示处理伤口。
3. 如刀口已贴上防水胶布，患者便可照常淋浴。
4. 刀口将于检查后 2 至 3 天愈合。乳房穿刺部位出现轻微瘀青属正常现象，约一星期后会自然消退。
5. 医生会处方止痛药，需要时服用。

出院后注意事项

请按时复诊。

如您对此手术有任何疑问或忧虑，请联络主诊医生。

经过医生的悉心诊治，相信您会逐渐康复。

若您阅读此章程后有任何查询，请记下相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知