

手術資料

全乳切除術 (Simple Mastectomy)

簡介

全乳切除術乃治療乳癌之外科手術之一，利用手術將整個有病變的乳房切除。

治療成效

全乳切除術旨在切除所有的乳腺組織。

手術過程

1. 此手術會在全身麻醉下進行；
2. 開一個橢圓形的切口，覆蓋乳頭乳暈及主要腫瘤上的皮膚；
3. 切除所有乳房組織；
4. 放入引流管；
5. 利用縫線/釘縫合傷口。


可能出現的風險及併發症

1. 傷口積血(需再施行手術清除血塊)
2. 傷口感染
3. 皮瓣壞死
4. 出血(可能需要再進行手術以排出血塊)
5. 疤痕增生或疙瘩

** 可能發生之風險或併發症未能盡錄。病人應明白無論手術如何妥善，仍有發生併發症的風險。如附近器官受損、手術後嚴重出血或滲漏時，可能需要進行另一手術治療這些併發症。

手術前的預備

1. 保持個人衛生可預防外科傷口感染。有見於此，院方建議病人於手術當日清洗身體及頭髮。
2. 醫生會向病人解釋施行手術的原因、程序及可能出現之併發症，病人明白後便可簽署同意書。
3. 請告知醫生及護士所有以往病歷、曾進行過的手術、最近所服用的藥物及因藥物或麻醉而引致的併發症。
4. 護理人員會按需要協助病人剃掉手術部位的毛髮。
5. 醫生會用外科手術記號筆標記手術位置，請勿洗掉。
6. 如有需要，醫生會處方手術前驅藥物。
7. 術前6至8小時禁止飲食。
8. 請脫下身上所有衣物(例如內衣褲、假牙、飾物和隱形眼鏡等)，然後換上手術衣。
9. 手術前請先排清小便。



手術後須知

一般情況

1. 全身麻醉後，病人可能會：

- 因麻醉時曾插喉而引致喉部輕微不適或疼痛；
 - 出現麻醉藥的副作用，包括疲倦、渴睡、噁心或嘔吐，如情況持續或加劇，請通知護士。
2. 如傷口感到疼痛，可通知護士，護士會按醫生指示為病人注射止痛針或提供口服止痛藥。
 3. 病人一般可於手術後兩至數天後出院。

傷口處理

1. 手術後，傷口已用無菌敷料蓋好，毋須特別料理。可能會有一至兩條膠喉連接到真空引流瓶，用以排出傷口的滲液。活動時，請小心引流喉管，避免過度牽拉。
2. 護士會按時排放引流液。
3. 如無不適，病人可如常沐浴。請保持傷口清潔及乾爽。

飲食

通常情況下，待麻醉藥效消退後，便可逐漸恢復正常飲食。

活動

1. 手術後翌日便可開始下床活動及進行上臂運動(請依照主診醫生的指示)。醫護人員會按進展指導你作漸進式上臂運動，需要時可於運動前半小時服食止痛藥。
2. 盡早起床活動有助迅速康復，宜每日按步就班增加活動量，以自己可以應付而不感疲倦為合。

出院後注意事項

1. 請遵照醫生指示服用藥物。
2. 引流：若出院時仍未拆除引流管，護士會指導相關的護理方法。
3. 活動：可自由活動並繼續上臂運動。
4. 配戴義乳：手術後暫時使用軟布義乳，手術後六星期，待傷口完全癒合後才安排配戴義乳。
5. 性生活：手術後約三至四星期，傷口便會癒合，可恢復性生活。女性在接受乳房手術後，通常會有不同程度的心理困擾，請多與你的伴侶溝通，需要時請與你的醫生及護士傾談。
6. 如傷口部位痛楚加劇或出現紅腫、流膿、寒顫、發熱(體溫 38°C 或 100°F 以上)或其他異常情況等，請即聯絡主診醫生或回院診治。
7. 請於指定日期、時間及地點覆診。

如病人對此手術有任何疑問或憂慮，請聯絡主診醫生。

經過醫生的悉心診治，相信病人會逐漸康復，並祝生活愉快！

若病人閱讀此單張後有任何查詢，請記下相關問題，以便醫生作出跟進。

由仁安醫院手術室管治委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢
本院保留一切刪改此單張之權利，而不作另行通知

