



牙科治疗资料

补牙 Filling

简介

牙齿的硬组织(珐琅质、牙本质)受到破坏，因脱钙而形成一个蛀洞。由于牙齿本身没有修复能力，在蛀洞形成后，只有用牙体复形的方法，用适当的材料填补，以便恢复咀嚼能力，进一步防止蛀牙的情况加剧。这种按蛀洞大小、深度、位置而选择适当补缀材料填补的方法称补牙。一般最常用作补牙的材料是银汞合金(俗称银粉)和合成树脂(俗称瓷粉)两种。



治疗效果

目的是恢复牙齿的形状和功能，有助于防止牙齿组织继续受到破坏及改善外观。

治疗过程

1. 银汞合金:
 - 可能需在局部麻醉下进行。
 - 首先医生会把牙齿蛀坏的部分清除，然后用银汞合金填充牙洞。
 - 最后，修饰及打磨补牙材料。
2. 合成树脂:
 - 可能需在局部麻醉下进行。
 - 首先，医生会把牙齿蛀坏的部分清除或把牙齿极脆弱的部分除去。
 - 用稀释酸液(例如 30%磷酸)酸蚀牙齿表面，然后冲洗及吹干。
 - 在已酸蚀的牙齿表面涂上黏固剂。
 - 用复合树脂填充牙洞，修补牙齿的缺失部分。
 - 用光固化仪器使复合树脂凝固。
 - 最后，修饰及打磨补牙材料。

治疗前的准备

医生会向患者解释做此治疗的原因、过程及可能出现的并发症。


补牙后的注意事项

1. 若用银汞合金补牙，在刚补好后二十四小时内，应避免使用该牙咀嚼食物，需等其完全硬化后再使用。
2. 若用合成树脂补牙，应减少喝咖啡、茶及抽烟，以免牙齿变色。
3. 补牙后可能会出现过敏痹痛的现象，但会慢慢改善，应尽量避免吃和喝太热或太凉的食物和饮料。若情况持续或愈来愈严重，便应约见牙科医生详细检查。
4. 如蛀牙较深，牙髓有可能在补牙前已受到细菌感染，如出现突发性肿痛情况，应立即联络主诊医生，可能需要接受进一步的治疗。

如您对此手术有任何疑问或忧虑，请联络牙科医生。

经过牙科医生的悉心诊治，相信您会逐渐康复。

若您阅读此章程后有任何查询，请记下相关问题，以便牙科医生作出跟进。祝阁下顺利安好！



由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知