



## 牙科治療程序資料

### 鑲配人造牙冠 Crown

#### 簡介

人造牙冠是用修復牙齒的材料，做成牙冠套，套在經過修改的牙冠上，適用於保護根管治療後的脆弱真牙。



圖片來源：

<https://keysdentalspecialists.com/wp-content/uploads/2021/09/PorcelainCrown-1080x675.jpg>

- 物料：
- 全瓷 (全鋁二氧化鋁 或 二矽酸鋰)
    - 特性：
      - 顏色和通透度較接近真牙。
      - 全瓷硬度明顯較高。
    - 缺點：
      - 比傳統搪瓷牙冠較厚，需要把牙齒多磨去一點。
      - 全瓷比金屬堅硬，如需要拆除會比較困難。
    - 適用：
      - 全瓷冠的顏色，無論是在牙齒擬真度、色澤、通透性都已經越來越好。因此，適用前面和後面的牙齒。
  - 搪瓷
    - 特性：
      - 瓷面美觀，接近真牙的顏色。
      - 費用相對經濟。
    - 缺點：
      - 需要一定厚度，因此較全 K 金牙套的牙齒多磨去一點。
      - 美觀程度不及全瓷牙冠，因為搪瓷的透明度不及全瓷牙冠，搪瓷牙冠的邊緣也會呈現灰黑色的金屬邊。
    - 適用：
      - 適用於前面和後面的牙齒。
  - 全 K 金
    - 特性：
      - 堅固耐用。
      - 堅硬，不易耗損。
      - 需要的厚度較薄，因此只需把牙齒磨細少許。
    - 缺點：金屬顏色，不美觀。
    - 適用：適用於沒有接受根管治療的後排牙齒，因為後牙需要承受強大咬合力，而對美觀方面的要求相對較低。

## 治療成效

此程序目的是要修復牙齒的形狀及恢復牙齒的功能，並改善牙齒外觀，例如顏色、形狀和大小。此外，還有助修復杜牙根後牙齒的咀嚼功能。

## 治療過程

1. 把牙齒表面磨小。
2. 印製牙模及套取牙齒咬合位置，磨小的牙齒需要套上臨時牙冠。
3. 在牙科工場內鑄造人造牙冠。
4. 一至兩星期後除去臨時牙冠，清洗該牙齒。
5. 用黏合劑把人造牙冠固定在牙齒上。

## 治療前的預備

醫生會向病人解釋施行治療的原因、過程及可能出現的併發症。

## 鑲配人造牙冠後的注意事項

1. 若臨時牙冠鬆脫，請聯絡牙科醫生，因牙齒的位置變化可能會影響牙冠的裝置。
2. 因磨小牙齒的過程中，牙髓有可能受刺激或受到感染，牙齒有可能短暫性的感到酸軟無力，若情況持續或愈趨嚴重，請儘快聯絡牙科醫生診治。
3. 鑲配的牙冠形狀與原本的牙齒會有少許不同，因此需時間適應。
4. 應如常作口腔護理，保持牙齒及牙齦清潔，並應定期約見牙科醫生作口腔檢查。

如病人對此程序有任何疑問或憂慮，請聯絡牙科醫生。

經過牙科醫生的悉心診治，相信病人會逐漸康復，並祝生活愉快！

若病人閱讀此單張後有任何查詢，請記下相關問題，以便牙科醫生作出跟進。

---

---

---

由仁安醫院手術室管治委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢  
本院保留一切刪改此單張之權利，而不作另行通知