



## 牙科治療程序資料

### 鑲配假牙托 Denture

#### 簡介

假牙托是可以隨意戴上或除下的假牙，作用是取代口腔內已失去的牙齒。

#### 種類： 1. 全口假牙托

- 用作代替全口已失去的牙齒。
- 利用口腔的肌肉把假牙托固定在頷骨上。因此，假牙托與口腔黏膜會吸附一起。
- 如果頷骨已植入鈦植體（種牙），全口假牙托可以利用鏢絲的接合裝置固定在鈦植體上。

物料： • 假牙托底部可用丙烯聚合體或 K 金製成。  
• 假牙可用丙烯聚合體或瓷製成。

#### 2. 部分假牙托

- 用作代替口腔內已失去的部分牙齒。
- 利用牙托底部伸延出來的金屬扣環，把假牙托固定在牙齒上。
- 如果頷骨已植入鈦植體（種牙），部分假牙托可以利用鏢絲的接合裝置固定在鈦植體上。

物料： • 假牙托底部可用丙烯聚合體、鈷鉻合金或鋼製成。  
• 假牙可用丙烯聚合體或瓷製成。



#### 治療成效

此程序目的是令牙齒恢復咀嚼功能及使發音準確。此外，可令缺牙的病人回復原本的面貌，避免咬合不正常。

#### 治療過程

1. 視乎情況把口腔內一些牙齒磨去少許部分。
2. 印取上下牙模及套取牙齒的咬合位置。
3. 在牙科工場內鑄造牙托底部，用蠟把假牙固定在牙托底部。
4. 讓病人試戴並作出調校。
5. 在牙科工場內把假牙托加工。
6. 假牙托完成後再讓病人試戴，並作出調校。

#### 治療前的預備

醫生會向病人解釋施行治療的原因、程序及可能發生的併發症。

## 鑲配假牙托後的注意事項

1. 戴新鑲配的假牙托初期可能會不習慣，需時慢慢適應。
2. 佩戴假牙初期，有可能會影響發音，但當適應了新的假牙後，情況會慢慢有所改善。
3. 在開始佩戴假牙托的首6個月內可能會感到不適，需要請牙科醫生調校假牙托。
4. 由於口腔情況會隨著時間改變，假牙托會變得不合戴，因此配戴者需要定期檢查口腔，讓牙科醫生按情況調校或修改假牙托。
5. 應保持口腔及假牙清潔，以防止蛀牙及牙周病。

## 保護牙托的方法

1. 每次進食後應用自來水或室溫水洗淨牙托。
2. 可用肥皂液和軟毛牙刷清潔牙托(不應使用牙膏，具磨蝕或腐蝕性之清潔劑)。
3. 先清潔牙齒，然後將牙托戴上。
4. 睡眠時切勿戴上牙托。
5. 如不使用牙托時，應浸在清潔的自來水、室溫水或牙托清潔液中，切勿使用熱水或腐蝕性清潔劑浸洗牙托。
6. 破爛或缺裂之牙托，需送交牙科醫生修理。
7. 配戴牙托後，亦應作定期口腔檢查，令牙托得以發揮其最佳效用。

如病人對此程序有任何疑問或憂慮，請聯絡牙科醫生。

經過牙科醫生的悉心診治，相信病人會逐漸康復，並祝生活愉快！

若病人閱讀此單張後有任何查詢，請記下相關問題，以便牙科醫生作出跟進。

---

---

---

由仁安醫院手術室管治委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢  
本院保留一切刪改此單張之權利，而不作另行通知