



牙科治疗资料

镶配假牙托 Denture

简介

假牙托是可以随意戴上或摘下的假牙，作用是取代口腔内已失去的牙齿。

种类： 1. 全口假牙托


- 用作代替全口已失去的牙齿。
- 利用口腔的肌肉把假牙托固定在颌骨上。因此，假牙托与口腔黏膜会吸附在一起。
- 如果颌骨已植入钛植体（种牙），全口假牙托可以利用螺丝的接合装置固定在钛植体上。

材料： • 假牙托底部可用丙烯聚合体或 K 金制成。
• 假牙可用丙烯聚合体或瓷制成。

2. 部分假牙托

- 用作代替口腔内已失去的部分牙齿。
- 利用牙托底部延伸出来的金属扣环，把假牙托固定在牙齿上。
- 如果颌骨已植入钛植体（植牙），部分假牙托可以利用螺丝的接合装置固定在钛植体上。

材料： • 假牙托底部可用丙烯聚合体、钴铬合金或钢制成。
• 假牙可用丙烯聚合体或瓷制成。



治疗效果

目的是令牙齿恢复咀嚼功能及使发音准确。此外，可令缺牙的患者恢复原本的面貌，避免咬合不正常。

治疗过程

1. 根据情况把口腔内一些牙齿磨去少许部分。
2. 印取上下牙模及套取牙齿的咬合位置。
3. 在牙科工场内铸造牙托底部，用蜡把假牙固定在牙托底部。
4. 让患者试戴并调校。
5. 在牙科工场把假牙托加工。
6. 假牙托完成后再让患者试戴，并调校。

治疗前的准备

医生会向患者解释治疗的原因、过程及可能出现的并发症。

镶配假牙托后的注意事项

1. 戴新镶配的假牙托初期可能会不习惯，需慢慢适应。
2. 佩戴假牙初期，有可能会影响发音，但当适应了新的假牙后，情况会慢慢有所改善。
3. 在开始佩戴假牙托的首6个月内可能会感到不适，需要请牙科医生调校假牙托。
4. 由于口腔情况会随着时间改变，假牙托会变得不合适，因此配戴者需要定期检查口腔，让牙科医生按情况调校或修改假牙托。
5. 应保持口腔及假牙清洁，以防止蛀牙及牙周病。

保护牙托的方法

1. 每次饭后应用自来水或室温水洗净牙托。
2. 可用皂液和软毛牙刷刷牙托(不应使用牙膏，具磨蚀或腐蚀性的清洁剂)。
3. 先刷牙齿，然后将牙托戴上。
4. 睡觉时切勿戴牙托。
5. 如不使用牙托时，应浸泡在清洁的自来水、室温水或牙托清洁液中，切勿使用热水或腐蚀性清洁剂。
6. 破或缺裂的牙托，需送交牙科医生修理。
7. 配戴牙托后，应定期作口腔检查，令牙托发挥其最佳作用。

如您对此手术有任何疑问或忧虑，请联络牙科医生。

经过牙科医生的悉心诊治，相信您会逐渐康复。

若您阅读此章程后有任何查询，请记住相关问题，以便牙科医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知