

手術資料

請掃描以下二維碼以 獲取電子檔案。



簡介

耳前竇是常見的先天性畸形。竇與皮膚連接的管,若被阻塞則會造成 感染而引致膿腫形成。耳前竇切除術是以外科手術切除耳前竇及清除 以往因感染而留下的疤痕。

適應症

- 1. 耳前竇曾有感染
- 2. 構成徵狀的耳前竇,例如有溢液流出

治療成效

此手術的預期成效是切除耳前竇,從而防止感染及舒緩症狀。

手術過程

- 1. 此手術會在全身或局部麻醉下進行;
- 2. 在耳前皮膚開一切口,包圍竇口及疤痕組織;
- 3. 清除該處的軟組織 (包括所有管);
- 4. 縫合傷口,並用無菌防水敷料覆蓋;
- 5. 可能須要以繃帶包紮頭部。

可能出現的風險及併發症

- 1. 常見的風險及併發症 (≥1%)
 - i) 傷口出血
 - ii) 傷口感染/膿腫
 - iii) 傷口破裂
 - iv) 傷口癒合欠佳
 - v) 疤痕/瘢痕瘤
 - vi) 復發
- 2. 不常見的嚴重風險及併發症 (<1%) 附近結構受損 (面部神經或血管)
- ** 可能發生之風險或併發症未能盡錄。病人應明白無論手術如何妥善,仍有發生併發症的風險。如附近器官受損、術後嚴重出血或滲漏時,可能需要進行另一手術來處理這些併發症。



圖片來源: http://rlbatesmd.blogspot.com/2010/01/histol ogic-relationship-of-preauricular.html

手術前的預備

- 1. 醫生會向病人解釋施行手術的原因、程序及可能出現之併發症,病人明白後便可簽署同意書。
- 2. 請告知醫生及護士所有以往病歷、曾進行過的手術、最近所服用的藥物(包括中藥及保健食品) 及因藥物或麻醉而引致的併發症。
- 3. 可能須要剃除耳朵前的毛髮。
- 4. 若以全身麻醉進行手術,術前6小時禁止飲食。
- 5. 請脫下身上所有衣物(例如內衣褲、假牙、飾物和隱形眼鏡等),然後換上手術衣。
- 6. 手術前請先排清小便。

手術後須知

一般情況

- 1. 全身麻醉後,病人可能會:
 - 因麻醉時曾插喉而引致喉部輕微不適或疼痛;
 - 出現麻醉藥的副作用,包括疲倦、渴睡、噁心或嘔吐,如情況持續或加劇,請通知護士。
- 2. 如傷口部位疼痛,可通知護士,護士會按醫生指示為病人注射止痛針或提供口服止痛藥。
- 3. 待麻醉藥作用消退後,便可按醫生指示恢復正常飲食。
- 4. 通常可在手術後當天出院。

傷口護理

- 1. 如頭部有繃帶,可在手術後一至兩天除去。
- 2. 保持傷口清潔乾爽。
- 3. 縫線會在一星期內拆除或自行溶解。

出院後注意事項

- 1. 請按照醫生指示服用藥物。
- 2. 如無不適,便可照常上班或上學。
- 3. 請勿做劇烈、競技運動及游泳。
- 4. 如出現傷口嚴重出血或有滲液、傷口紅腫、疼痛增加、發冷、寒顫、發熱(體溫高達 38℃ 或 100.4°F以上)或其他異常情況,請即聯絡主診醫生或回院診治。
- 5. 請於指定日期、時間及地點覆診。

其他治療方法

保守療法:使用抗生素及用引流清理膿液

不治療的後果

- 1. 感染風險及後遺症
- 2. 耳前竇引起的持續徵狀

如病人對此手術有任何疑問或憂慮,請聯絡主診醫生。經過醫生的悉心診治,相信病人會逐漸康復,並祝生活愉快!若病人閱讀此單張後有任何查詢,請記下相關問題,以便醫生作出跟進。

由仁安醫院手術室管治委員會編輯

以上資料只供參考,詳情請向主診醫生查詢 本院保留一切刪改此單張之權利,而不作另行通知

