



手術資料

乳突切除術 Mastoidectomy

簡介

乳突切除術是以外科手術切除耳後的乳突氣房及耳骨病灶。

- 適應症：
1. 急性乳突炎
 2. 慢性化膿性中耳炎及乳突炎
 3. 膽脂瘤
 4. 腫瘤
 5. 人工耳蝸植入術

禁忌症：硬化型乳突

治療成效

此手術可助移除膽脂瘤或腫瘤、緩解急性或慢性耳炎及改善聽力。

手術過程

1. 此手術會在全身麻醉下進行；
2. 皮膚切口會在耳前或耳後；
3. 乳突內的病灶會在顯微鏡下切除；
4. 普遍的情況下，傷口需加壓包紮。

可能出現的風險及併發症

1. 輕微：
 - i) 短暫性面癱
 - ii) 耳鳴
 - iii) 短暫性失去聽力
 - iv) 暈眩
 - v) 味覺改變
2. 嚴重：
 - i) 面部神經麻痺
 - ii) 血管損傷
 - iii) 硬膜損傷或導致腦脊液漏
 - iv) 乳突皮下瘻管(罕見)

** 可能出現之風險或併發症未能盡錄。病人應明白無論手術如何妥善，仍有出現併發症的風險。如附近器官受損、手術後嚴重出血或滲漏時，可能需要進行另一手術治療這些併發症。



圖片來源：

https://res.cloudinary.com/dk0z4ums3/image/upload/v1675659522/attached_image/mastoiditis.jpg

手術前的預備

1. 保持個人衛生可預防外科傷口感染。有見於此，院方建議病人於手術當日清洗身體及頭髮。
2. 醫生會向病人解釋施行手術的原因、過程及可能出現之併發症，病人明白後便可簽署同意書。
3. 請告知醫生及護士所有以往病歷、曾進行過的手術、最近所服用的藥物及因藥物或麻醉而引致的併發症。
4. 可能需要剃除耳旁的毛髮。
5. 術前 6 小時禁止飲食。
6. 請脫下身上所有衣物(例如內衣褲、假牙、飾物和隱形眼鏡等)，然後換上手術衣。
7. 手術前請先排清小便。

手術後須知

一般情況

1. 全身麻醉後，病人可能會：
 - 因麻醉時曾插喉而引致喉部輕微不適或疼痛；
 - 出現麻醉藥的副作用，包括疲倦、渴睡、噁心或嘔吐，如情況持續或加劇，請通知護士。
2. 如傷口部位疼痛，可通知護士，護士會按醫生指示為病人注射止痛針或提供口服止痛藥。
3. 病人的耳朵可能會出現痛楚或阻塞的感覺。

傷口處理

1. 手術後，傷口會蓋上無菌敷料以吸收耳內排出的分泌物，請保持敷料完整直至覆診時由醫生拆除。
2. 請儘量避免讓水流入耳內。
3. 如有需要，醫生會處方抗生素。

出院後注意事項

1. 如傷口部位疼痛加劇或出現紅腫、濃性滲液、大量出血、寒顫、發熱(體溫高達 38°C 或 100.4°F 以上) 或其他異常情況等，請即聯絡主診醫生或回院診治。
2. 需定期覆診以監察膽脂瘤復發及聽力功能。
3. 請於指定日期、時間及地點覆診。

如病人對此手術有任何疑問或憂慮，請聯絡主診醫生。

經過醫生的悉心診治，相信病人會逐漸康復，並祝生活愉快！

若病人閱讀此單張後有任何查詢，請記下相關問題，以便醫生作出跟進。

由仁安醫院手術室管治委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢
本院保留一切刪改此單張之權利，而不作另行通知

