



手术资料

乳突切除术 Mastoidectomy

简介

乳突切除术是通过手术切除耳后的乳突气房及耳骨病灶。

- 适应症：
1. 急性乳突炎
 2. 慢性化脓性中耳炎及乳突炎
 3. 胆脂瘤
 4. 肿瘤
 5. 人工耳蜗植入术

禁忌症：硬化型乳突

治疗效果

此手术可助切除胆脂瘤或肿瘤、缓解急性或慢性耳炎及改善听力。

手术过程

1. 此手术会在全身麻醉下进行；
2. 皮肤切口会在耳前或耳后；
3. 乳突内的病灶会在显微镜下切除；
4. 一般情况下，刀口需加压包扎。

可能出现的风险及并发症

1. 轻微：
 - i) 短暂性面瘫
 - ii) 短暂性失去听力
 - iii) 耳鸣
 - iv) 眩晕
 - v) 味觉改变
2. 严重：
 - i) 面部神经麻痹
 - ii) 血管损伤
 - iii) 硬膜损伤或导致脑脊液漏
 - iv) 乳突皮下瘘管(罕见)

** 可能出现之风险或并发症未能尽录。患者应明白无论手术如何妥善，仍有出现并发症的风险。如附近器官受损、手术后严重出血或渗漏时，可能需要进行另一手术治疗这些并发症。



图片来源：

https://res.cloudinary.com/dk0z4ums3/image/upload/v1675659522/attached_image/mastoiditis.jpg

手术前的准备

1. 保持个人卫生可预防刀口感染。患者于手术当天务必洗澡及洗头。
2. 医生会向患者解释手术的原因、过程及可能出现之并发症，患者明白后便须签署同意书。
3. 请告知医生及护士所有以往病史、曾进行过的手术、最近所服用的药物及因药物或麻醉剂而引致的并发症。
4. 可能需要剃除耳旁的毛发。
5. 术前6小时禁止饮食。
6. 请除去身上所有衣物(如内衣裤、假牙、饰物和隐形眼镜等)，换上手术衣。
7. 手术前请先排清小便。

手术后须知

一般情况

1. 全身麻醉后，患者可能会：
 - 因麻醉时曾插管而引致喉部轻微不适或疼痛；
 - 出现麻醉药的副作用，包括疲倦、渴睡、恶心或呕吐，如情况持续或加剧，请通知护士。
2. 如刀口部位疼痛，可通知护士，护士会按医生指示注射止痛针或提供口服止痛药。
3. 患耳可能会有疼痛或阻塞的感觉。

刀口处理

1. 手术后，刀口会盖上无菌敷料吸收耳内排出的分泌物，请保持敷料完整直至复诊时由医生拆除。
2. 请尽量避免水流入耳内。
3. 如有需要，医生会处方抗生素。

出院后注意事项

1. 如刀口部位疼痛加剧或出现红肿、浓性渗液、大量出血、寒颤、发烧(体温高达 38°C 或以上)或其他异常情况，请即联络主诊医生或回院治疗。
2. 需定期复诊监察胆脂瘤复发及听力功能。
3. 请按时复诊。

如您对此手术有任何疑问或忧虑，请联络主诊医生。

经过医生的悉心治疗，相信您会逐渐康复。

若您阅读此章程后有任何查询，请记住相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知

