



手術資料

頸部腫塊切除術 Excision of Neck Mass

簡介

頸部腫塊切除術是通過手術切除頸部腫塊以作治療和診斷之用，切除的腫塊需送往病理部作臨床組織化驗。

治療成效

1. 完全切除腫塊，消除病患，改善外觀
2. 取出組織以作臨床診斷


手術過程

1. 此手術視乎腫塊的大小及位置，而決定在全身麻醉、局部麻醉、監測麻醉或靜脈注射鎮靜劑下進行；
2. 在頸上開一切口；
3. 切除腫塊；
4. 縫合傷口。

可能出現的風險及併發症

1. 傷口出血
2. 傷口感染
3. 肩痛及抬肩乏力
4. 頸部皮膚麻痺
5. 疤痕增生或形成癍瘤
6. 皮膚壞死
7. 神經受損
8. 氣胸
9. 乳糜漏
10. 淋巴腫

** 可能出現之風險或併發症未能盡錄。病人應明白無論手術如何妥善，仍有出現併發症的風險。如附近器官受損、手術後嚴重出血或滲漏時，可能需要進行另一手術治療這些併發症。



圖片來源：

<https://www.thomashosurgery.com/wp-content/uploads/2020/09/neck-lump-illustration-e1601209585797.png>

手術前的預備

1. 保持個人衛生可預防外科傷口感染。有見於此，院方建議病人於手術當日清洗身體及頭髮。
2. 醫生會向病人解釋施行手術的原因、過程及可能出現之併發症，病人明白後便可簽署同意書。
3. 請告知醫生及護士所有以往病歷、曾進行過的手術、最近所服用的藥物及因藥物或麻醉而引致的併發症。如正服用影響血液凝固的藥物，例如阿士匹靈(Aspirin)、華法林(Warfarin)、拜瑞妥(Xarelto)或百達生(Pradaxa)及中藥和營養補充品，請儘早通知醫生。
4. 術前 6 小時禁止飲食。(只適用於全身麻醉)
5. 請脫下身上所有衣物(例如內衣褲、假牙、飾物和隱形眼鏡等)，然後換上手術衣。
6. 手術前請先排清小便。

手術後須知

一般情況

1. 有需要時，可能會放入引流管。
2. 墊高頭部以減少瘀傷及腫脹。
3. 如有需要，可服用醫生處方之止痛藥。
4. 可在手術當天或翌日出院。

傷口護理

1. 請保持傷口清潔及乾爽。
2. 傷口部位會出現疤痕，但數月後會逐漸消退。

飲食

待麻醉藥作用消退後，便可按指示恢復正常飲食。

活動

一至兩星期後便可恢復輕量活動。

出院後注意事項

1. 如傷口部位疼痛加劇或出現紅腫、大量出血、虛脫、寒顫或發熱(體溫高達 38°C 或 100.4°F 以上)或其他異常情況等，請即聯絡主診醫生或回院診治。
2. 請於指定日期、時間及地點覆診。

如病人對此手術有任何疑問或憂慮，請聯絡主診醫生。

經過醫生的悉心診治，相信病人會逐漸康復，並祝生活愉快！

若病人閱讀此單張後有任何查詢，請記下相關問題，以便醫生作出跟進。

由仁安醫院手術室管治委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢
本院保留一切刪改此單張之權利，而不作另行通知

