

手术资料

颈部肿块切除术 Excision of Neck Mass

简介

颈部肿块切除术是通过手术切除颈部肿块，切除的肿块需送往病理部作临床组织检验。

治疗效果

1. 完全切除肿块，消除病患，改善外观
2. 取出组织进行临床诊断

手术过程

1. 手术视肿块的大小及位置，而决定在全身麻醉、局部麻醉、监测麻醉或静脉注射镇静剂下进行
2. 在颈上切一切口
3. 切除肿块
4. 缝合

可能出现的风险及并发症

1. 出血
2. 感染
3. 肩痛及抬肩乏力
4. 颈部皮肤麻痹
5. 疤痕增生或形成癭瘤
6. 皮肤坏死
7. 神经受损
8. 气胸
9. 乳糜漏
10. 淋巴肿

** 可能出现之风险或并发症未能尽录。患者应明白无论手术如何妥善，仍有出现并发症的风险。如附近器官受损、手术后严重出血或渗漏时，可能需要进行另一手术治疗这些并发症。

手术前的准备

1. 保持个人卫生可预防刀口感染。
2. 医生会向患者解释施行手术的原因、过程及可能出现之并发症，患者明白后便须签署同意书。
3. 请告知医生及护士所有以往病史、曾进行过的手术、最近所服用的药物及因药物或麻醉剂而引致的并发症。如正服用影响血液凝固的药物，例如阿斯匹林(Aspirin)、华法林(Warfarin)、拜瑞妥(Xarelto)或 Pradaxa(百达生)及中药和营养补充品，请尽早通知医生。
4. 术前 6 小时禁止饮食(只适用于全身麻醉)。

5. 请除去身上所有衣物(如内衣裤、假牙、饰物和隐形眼镜等)，换上手术衣。
6. 手术前请先排清小便。

手术后须知

一般情况

1. 有需要时，可能会放入引流管。
2. 垫高头部以减少瘀伤及肿胀。
3. 如有需要，可服用医生处方之止痛药。
4. 可在手术当天或翌日出院。

刀口护理

1. 请保持刀口清洁干燥。
2. 刀口部位会出现疤痕，但数月后会逐渐消退。

饮食

情况稳定后可恢复正常饮食。

活动

一至两星期后便可恢复轻量活动。

出院后注意事项

1. 如刀口部位的疼痛加剧及出现红肿、虚脱、大量出血、寒颤或发烧(体温高达 38°C 或以上)或其他异常情况，请即联络主诊医生或回院治疗。
2. 请按时复诊。

如您对此手术有任何疑问或忧虑，请联络主诊医生。

经过医生的悉心诊治，相信您会逐渐康复。

若您阅读此章程后有任何查询，请记下相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知