



程序資料


鼓室內注射 Intratympanic Injection

簡介

鼓室內注射是一項簡單的治療程序，醫生會把藥物如慶大黴素或類固醇注射到中耳內，藥物會經圓窗--中耳至內耳的開口--被內耳吸收。通常須要進行數次注射，以完成整個療程。

治療成效

鼓室內注射用於治療內耳疾病，特別是對標準治療方案反應不足的突發感覺神經性聽力喪失和美尼爾氏症(俗稱耳水不平衡)的患者。



圖片來源:

<https://www.srft.nhs.uk/EasysiteWeb/getresource.axd?AssetID=56632&type=full&servicetype=Inline>

程序過程

1. 安排病人平臥，頭轉向不用接受注射的一側。
2. 在顯微鏡的協助下，用一枝連接注射器的細針穿過耳膜。
3. 把藥物注射到中耳內。
4. 病人需維持姿勢 20 至 30 分鐘，讓藥物被內耳吸收。

可能出現的風險及併發症

1. 常見的副作用：短暫暈眩、注射部位疼痛和燒灼感
2. 其他可能的併發症
 - 鼓膜穿孔（罕見，穿孔通常微細並且容易修復）
 - 感染（罕見）
 - 聽力喪失（罕見，注射慶大黴素引致聽力喪失的機率較高）

** 可能出現之風險或併發症未能盡錄。病人應明白無論程序如何妥善，仍有出現併發症的風險。

程序前的預備

1. 醫生會向病人解釋施行程度的原因、過程及可能出現之併發症，病人明白後便可簽署同意書。
2. 請告知醫生及護士所有以往病歷、曾進行過的手術、最近所服用的藥物及因藥物或麻醉而引致的併發症。
3. 可能須要進行全面聽力測試。

程序後須知

1. 注射部位需要約一星期才能癒合。在耳膜癒合之前，
 - 避免耳朵入水，洗頭時可使用耳塞；
 - 切勿游泳和潛水；和
 - 避免擤鼻。
2. 病人通常會在首數小時感到暈眩，接受注射當天避免駕駛及機械操作。
3. 注射慶大黴素的患者，預計在注射後數天會出現身體難以平衡的感覺。此狀況維持一星期後應該會消退。
4. 請於指定日期、時間及地點覆診。

如病人對此程序有任何疑問或憂慮，請聯絡主診醫生。

經過醫生的悉心診治，相信病人會逐漸康復，並祝生活愉快！

若病人閱讀此單張後有任何查詢，請記下相關問題，以便醫生作出跟進。

由仁安醫院手術室管治委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢
本院保留一切刪改此單張之權利，而不作另行通知