



治疗资料

鼓室内注射 Intratympanic Injection

简介

鼓室内注射是一项简单的治疗程序，医生会把药物如庆大霉素或类固醇注射到中耳内，药物会经圆窗--中耳至内耳的开口--被内耳吸收。通常须要进行数次注射，以完成整个疗程。

治疗效果

鼓室内注射用于治疗内耳疾病，特别是对标准治疗方案反应不足的突发感觉神经性听力丧失和美尼尔氏症(俗称耳水不平衡)的患者。



图片来源:

<https://www.srft.nhs.uk/EasysiteWeb/getresource.axd?AssetID=56632&type=full&servicetype=Inline>

治疗过程

1. 患者平卧，头转向不用接受注射的一侧。
2. 在显微镜的协助下，用一根连接注射器的针穿过耳膜。
3. 把药物注射到中耳内。
4. 患者需维持此姿势 20 至 30 分钟，让药物被内耳吸收。

可能出现的风险及并发症

1. 常见的副作用：短暂眩晕、注射部位疼痛和烧灼感
2. 其他可能的并发症
 - 鼓膜穿孔（罕见，穿孔通常轻微并且容易修复）
 - 感染（罕见）
 - 丧失听力（罕见，注射庆大霉素引致听力丧失的机率较高）

** 可能出现之风险或并发症未能尽录。患者应明白无论如何妥善，仍有出现并发症的风险。

治疗前的准备

1. 医生会向患者解释做此治疗的原因、过程及可能出现之并发症，患者明白后便须签署同意书。
2. 请告知医生及护士所有以往病史、曾进行过的手术、最近所服用的药物及因药物或麻醉剂而引致的并发症。
3. 可能须要进行全面听力测试。

治疗后须知

1. 注射部位需要约一星期才能愈合。在耳膜愈合之前，
 - 避免耳朵进水，洗头时可使用耳塞；
 - 切勿游泳和潜水；和
 - 避免擤鼻子。
2. 通常会在首数小时感到眩晕，接受注射当天请勿驾驶及操作机械。
3. 注射庆大霉素的患者，预计在注射后数天会出现身体难以平衡的感觉。此状况维持一星期后应该会消退。
4. 请按时复诊。

如您对此治疗有任何疑问或忧虑，请联络主诊医生。

经过医生的悉心诊治，相信您会逐渐康复。

若您阅读此章程后有任何查询，请记下相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知